

## Interactions médicamenteuses

Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin et à votre pharmacien.

### -> Interactions médicamenteuses :



- Gaviscon, Carbolevure, Smecta : intervalle de 2 heures avec Verzenios
- Anticoagulants oraux, ...

### -> Interactions avec les plantes (tisanes, gélules, huiles essentielles, ...) :



A éviter : pamplemousse, millepertuis, échinacée, camomille, gingembre, ginseng, thym, valériane, verveine, curcuma, aloe vera (liste non exhaustive)



Ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.


## Contacts



Oncotel : 03.81.47.99.99

Nom du pharmacien (hôpital):

---

Disponible uniquement en pharmacie de ville 

## Fiche patient

# VERZENIOS®

## Abemaciclib

C'est une thérapie ciblée indiquée dans le cancer du sein localement avancé ou métastatique en association avec letrozole ou fulvestrant

Présentation en boîte de 14 ou 56 comprimés (plaquettes de 7)

Il existe 3 dosages :  
50/100/150mg




*Cette fiche ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire*

Cette fiche a été validée par l'équipe médicale d'oncologie

## Posologie / Plan de prise

**En 2 prises par jour, tous les jours à la même heure, avec un grand verre d'eau, pendant ou en dehors des repas**



Conservation dans sa **boîte d'origine**, à **température ambiante**, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

**A conserver hors de la portée des enfants.**

**Contactez rapidement ONCOTEL si**

- Nausées et vomissements persistants
- Diarrhées importantes (≥4 selles par jour)
- Perte de poids rapide et importante (≥5% du poids initial)
- Température auriculaire > 38.3°C ou < 36°C, ou égale à 38°C deux fois à une heure d'intervalle
- Signes hémorragiques (sang dans les selles, hématomes (bleus), saignements de nez)
- Troubles cutanés gênant au quotidien

## Conseils



Ne pas **ouvrir, écraser, ni mâcher** les gélules



Se laver soigneusement les mains **avant et après** chaque prise



Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement

Utiliser une méthode de contraception efficace en cas de rapports sexuels avec une femme enceinte ou susceptible de l'être



Rapportez à l'officine les médicaments et emballages non utilisés



**N'arrêtez jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin spécialiste**










En cas de **souillure** des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge **rapidement et séparément**, en machine à **température élevée** (60-90°C)



Si vous avez oublié une prise de médicament :

- **ne prenez pas la dose oubliée**
- **prenez la dose habituelle le jour suivant**
- noter l'oubli

## Prévention et gestion des principaux effets indésirables

	Nausées et vomissements	En cas de vomissements : Fractionner l'alimentation en plusieurs petits repas. Privilégier les plats froids sans odeur aux préparations trop grasses et épicées Ne pas reprendre la prise si vomissements
	Diarrhées	En cas de diarrhées : Privilégier pâtes, riz, pommes de terre, carottes cuites, banane, gelée de coing... Hydratez vous régulièrement (bouillon de légumes, tisane, coca dégazé, eau minérale...)
	Perte d'appétit	Fractionner les repas, discuter compléments nutritionnels à la prochaine consultation
	Altération du goût	Surveiller l'apparition du symptôme et prévenir votre médecin si gêne quotidienne
	Leucopénie : baisse des globules blancs, neutropénie, risque d'infections	Surveiller les signes d'infections (fièvre, toux, brûlures urinaires) limiter les contacts avec les personnes malades, lavage des mains, désinfection des plaies, hygiène buccale Recommander la vaccination antigrippale et antipneumococcique
	Thrombopénie : baisse des plaquettes	Prudence avec anti-inflammatoires, aspirine, anticoagulants
	Perte de cheveux / cheveux fragilisés	Se laver les cheveux à distance de la prise des médicaments, se couper les cheveux courts. Envisager une prothèse capillaire
	Cutanés - éruption, acné, sécheresse de la peau, photosensibilité,	Eviter les chaussures serrées, les frottements et l'eau trop chaude Eviter les expositions au soleil et utiliser un écran solaire total Utiliser un savon doux et une crème hydratante. Surveiller la surinfection
	Fatigue	Adapter son mode de vie tout en restant actif, se fixer des priorités et des moments de repos
	Perturbation du bilan hépatique	Surveillance biologique et montrer le résultat à votre médecin