

## Interactions médicamenteuses

Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin et à votre pharmacien.



### -> Interactions médicamenteuses :

- Gaviscon, Carbolevure, Smecta : intervalle de 2 heures avec Zytiga
- Rifampicine
- dextrométhorphan, ....

### -> Interactions avec les plantes (tisanes, gélules, huiles essentielles, ...) :



A éviter : pamplemousse, millepertuis, ginseng, curcuma, ginkgo, vigne rouge (liste non exhaustive)




Ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.

## Contacts



Oncotel : 03.81.47.99.99

Nom du pharmacien (hôpital):  
\_\_\_\_\_

Disponible uniquement  
en  
pharmacie de ville 

## Fiche patient

# ZYTIGA®

## Abiraterone

C'est une hormonothérapie indiquée en association avec la prednisone ou prednisolone dans le traitement du cancer de la prostate

Présentation en boîte de 60 comprimés

Il existe 1 dosage :  
500mg



*Cette fiche ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire*

Cette fiche a été validée par l'équipe médicale d'oncologie

## Posologie / Plan de prise

En **1 prise par jour**, tous les jours à la **même heure** avec un grand verre d'eau au moins **1 heure avant ou 2 heures après un repas**



**Prednisone ou prednisolone** à prendre en **2 prises par jour** (matin et soir)

**Ne jamais arrêter** Prednisone ou Prednisolone **sans avis médical**

**⚠ Ne jamais arrêter la castration chimique** (analogue de la LH-RH : **DECAPEPTYL®** ou **ENANTONE®** ou **ELIGARD®** ou **ZOLADEX®** ou **FIRMAGON®..etc**)

Conservation dans sa **boîte d'origine**, à **température ambiante**, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

**A conserver hors de la portée des enfants.**

Contactez rapidement  
**ONCOTEL** si

- Si prise de poids rapide et inattendue (signe d'oedème)
- Signes d'hypertension (Maux de tête, bourdonnements d'oreille et/ou vertiges)
- Brûlures urinaires, urines troubles

## Conseils



Ne pas couper, mâcher, croquer ou écraser les comprimés



Se laver soigneusement les mains **avant et après** chaque prise



Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement

Utiliser une méthode de contraception efficace en cas de rapports sexuels avec une femme enceinte ou susceptible de l'être



Rapportez à l'officine les médicaments et emballages non utilisés



**N'arrêtez jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin spécialiste**



En cas de **souillure** des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge **rapidement et séparément**, en machine à **température élevée** (60-90°C)



Si vous avez oublié une prise de médicament :

- **ne prenez pas la dose oubliée**
- **prenez la dose habituelle le jour suivant**
- noter l'oubli

## Prévention et gestion des principaux effets indésirables

	Œdèmes	Alimentation à faible teneur en sel, éviter les vêtements serrés, surveiller son poids, élever les pieds en position assise
	Hypertension artérielle	Mesurer régulièrement la tension, savoir reconnaître les signes d'hypertension : maux de tête, troubles de la vision, bourdonnements d'oreilles
	Surveillance prise de sang : troubles hépatobiliaires et hypokaliémie	Surveillance biologique et montrer le résultat à votre médecin
	Infection urinaire	Bien s'hydrater : 1,5 L d'eau par jour