

## Interactions médicamenteuses

Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin et à votre pharmacien.

### -> Interactions médicamenteuses :



- Gaviscon, Carbolevure, Smecta : intervalle de 2 heures avec Alecensa
- Anticoagulants oraux
- Antifongiques azolés, ...

### -> Interactions avec les plantes (tisanes, gélules, huiles essentielles, ...) :



A éviter : pamplemousse, millepertuis, échinacée, camomille, gingembre, ginseng, thym, valériane, verveine, curcuma, aloe vera (liste non exhaustive)



Ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.


## Contacts



Oncotel : 03.81.47.99.99

Nom du pharmacien (hôpital):

---

Disponible uniquement  
en  
pharmacie de ville 

## Fiche patient

# ALECENSA®

## Alectinib

C'est une thérapie ciblée indiquée en monothérapie dans le traitement du cancer du poumon

Présentation en boîte de 224 gélules

Il existe 1 dosage :  
150mg




*Cette fiche ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire*

Cette fiche a été validée par l'équipe médicale d'oncologie

## Posologie / Plan de prise

**600mg** (4 gélules de 150mg) en 2 prises par jour, tous les jours à la **même heure** avec un grand verre d'eau **pendant les repas**



Conservation dans sa **boîte d'origine**, à **température ambiante**, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

**A conserver hors de la portée des enfants.**

## Contactez rapidement ONCOTEL si

- Nausées et vomissements persistants
- Diarrhées importantes ( $\geq 4$  selles par jour)
- Constipation ou présence de douleurs abdominales et/ou d'inefficacité des mesures laxatives
- Troubles cutanés gênant au quotidien
- Douleurs à l'œil, larmoiement ou rougeurs, vision floue ou sensibilité à la lumière
- Prise de poids rapide et inattendue (signe d'œdèmes)
- Apparition de symptômes pulmonaires

## Conseils



Ne pas ouvrir les gélules



Se laver soigneusement les mains **avant et après** chaque prise

Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement



Utiliser une méthode de contraception efficace en cas de rapports sexuels avec une femme enceinte ou susceptible de l'être



Rapportez à l'officine les médicaments et emballages non utilisés



**N'arrêtez jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin spécialiste**



En cas de **souillure** des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge **rapidement et séparément**, en machine à **température élevée** (60-90°C)



Si vous avez oublié une prise de médicament :



Il reste + de 6h avant la prochaine prise












Il reste - de 6h avant la prochaine prise

→ Prenez la dose oubliée

→ Ne prenez pas la dose oubliée

## Prévention et gestion des principaux effets indésirables

	Nausées et vomissements	En cas de vomissements : Fractionner l'alimentation en plusieurs petits repas. Préférer les plats froids sans odeur aux préparations trop grasses et épicées. Ne pas reprendre la prise si vomissements
	Diarrhées	En cas de diarrhées : Privilégier pâtes, riz, pommes de terre, carottes cuites, banane, gelée de coing... Hydratez vous régulièrement (bouillon de légumes, tisane, coca dégazé, eau minérale...)
	Constipation	En cas de constipation : Penser à vous hydrater. Boire au minimum 1.5 l/jour : jus de fruits, eau d'Hépar... Consommer des légumes et des fruits
	Cutané - éruption, acné, sécheresse de la peau, photosensibilité	Eviter les chaussures serrées, les frottements et l'eau trop chaude Eviter les expositions au soleil et utiliser un écran solaire total Utiliser un savon doux et une crème hydratante Surveiller la surinfection
	Troubles visuels	Eviter une atmosphère trop sèche ou enfumée, les longues durées devant les écrans
	Œdèmes	Alimentation à faible teneur en sel, éviter les vêtements serrés, surveiller son poids, élever les pieds en position assise
	Pneumopathie interstitielle / pneumopathie inflammatoire	Surveillance clinique
	Troubles hépatiques	Surveillance biologique et montrer le résultat à votre médecin
	Troubles musculaires	Surveillance biologique et montrer le résultat à votre médecin
	Bradycardie	Surveiller la fréquence cardiaque et pression artérielle