

Interactions médicamenteuses

Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin et à votre pharmacien.



-> Interactions médicamenteuses :

- Gaviscon, Carbolevure, Smecta : intervalle de 2 heures avec Erleada
- Médicament allongeant le QT
- Statines, anticoagulants oraux, ...

-> Interactions avec les plantes (tisanes, gélules, huiles essentielles, ...) :



A éviter : pamplemousse, millepertuis, échinacée, camomille, gingembre, ginseng, thym, valériane, verveine, curcuma, aloe vera, chardon-marie, hibiscus, aubépine, carambole, thé vert, menthe poivrée (liste non exhaustive)



Ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.

Contacts



Oncotel : 03.81.47.99.99

Nom du pharmacien (hôpital):

Disponible uniquement en pharmacie de ville



Fiche patient

ERLEADA®

apalutamide

C'est une hormonothérapie indiquée dans le traitement du cancer de la prostate

Présentation en boîte de 120 comprimés (plaquettes de 24)

Il existe 1 dosage :
60mg



Cette fiche ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire

Cette fiche a été validée par l'équipe médicale d'oncologie

Posologie / Plan de prise

En **1 prise par jour**, tous les jours à la **même heure**, avec un grand verre d'eau, **pendant ou en dehors des repas**.

La posologie habituelle est **240mg/jour** (4 comprimés de 60mg).



Prednisone ou prednisolone à prendre en **2 prises par jour** (matin et soir)

Ne jamais arrêter Prednisone ou Prednisolone **sans avis médical**

Ne jamais arrêter la castration chimique (analogue de la LH-RH : DECAPEPTYL® ou ENANTONE® ou ELIGARD® ou ZOLADEX® ou FIRMAGON®..etc)

Conservation dans sa **boîte d'origine**, à **température ambiante**, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

A conserver hors de la portée des enfants.

Contactez rapidement ONCOTEL si

- Nausées et vomissements persistants
- Diarrhées importantes (≥4 selles par jour)
- Perte de poids rapide et importante (≥5% du poids initial)
- Signes d'hypertension (Maux de tête, bourdonnements d'oreille et/ou vertiges)
- Prise de poids rapide et inattendue (signe d'oedèmes)

Conseils



Ne pas couper, mâcher, croquer ou écraser les comprimés



Se laver soigneusement les mains **avant et après** chaque prise



Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement

Utiliser une méthode de contraception efficace en cas de rapports sexuels avec une femme enceinte ou susceptible de l'être



Rapportez à l'officine les médicaments et emballages non utilisés



N'arrêtez jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin spécialiste













En cas de **souillure** des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge **rapidement et séparément**, en machine à **température élevée** (60-90°C)



Si vous avez oublié une prise de médicament :

- **Prenez la dose oubliée dès que possible**
- **Puis prenez la dose habituelle le jour suivant**

Prévention et gestion des principaux effets indésirables

	Nausées et vomissements	En cas de vomissements : Fractionner l'alimentation en plusieurs petits repas. Préférer les plats froids sans odeur aux préparations trop grasses et épicées Ne pas reprendre la prise si vomissements
	Diarrhées	En cas de diarrhées : Privilégier pâtes, riz, pommes de terre, carottes cuites, banane, gelée de coing... Hydratez vous régulièrement (bouillon de légumes, tisane, coca dégazé, eau minérale...)
	Perte d'appétit	Fractionner les repas, discuter compléments nutritionnels à la prochaine consultation
	Bouffées de chaleur	Bien s'hydrater : 1,5 L d'eau par jour
	Bilan thyroïdien perturbé	Surveillance biologique et montrer le résultat à votre médecin
	Hypertension artérielle	Mesurer régulièrement la tension, savoir reconnaître les signes d'hypertension : maux de tête, troubles de la vision, bourdonnements d'oreilles Limiter la consommation de sel
	Cedèmes	Alimentation à faible teneur en sel, éviter les vêtements serrés, surveiller son poids, élever les pieds en position assise
	Fractures et risque de chute	Surveillance des patients à risque
	Fatigue	Adapter son mode de vie tout en restant actif, se fixer des priorités et des moments de repos
	Rash cutané	Eviter les expositions au soleil Utiliser un savon doux et une crème émolliente Surveiller la surinfection

Pour plus de renseignements, consulter la notice du médicament.