

## Interactions médicamenteuses

Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin et à votre pharmacien.

### -> Interactions médicamenteuses :



- Gaviscon, Carbolevure, Smecta : intervalle de 2 heures avec Blu-285
- Rifampicine, carbamazépine
- Antifongiques azolés, ...

### -> Interactions avec les plantes (tisanes, gélules, huiles essentielles, ...) :



A éviter : pamplemousse, millepertuis, échinacée, camomille, gingembre, ginseng, thym, valériane, verveine, curcuma, aloe vera, (liste non exhaustive)



**Ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.**

## Contacts



Oncotel : 03.81.47.99.99

Nom du pharmacien (hôpital):

---

Disponible uniquement  
en  
**pharmacie hospitalière**



## Fiche patient

**BLU-285<sup>®</sup>**  
**Avapritinib**

C'est une thérapie ciblée indiquée dans le traitement des tumeurs stromales gastro-intestinales (GIST).

Présentation en flacon de 90 comprimés

Il existe 2 dosages :  
25/100mg




*Cette fiche ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire*

Cette fiche a été validée par l'équipe médicale d'oncologie

## Posologie / Plan de prise

En **1 prise par jour**, tous les jours à la même heure, avec un grand verre d'eau, **au moins 1h avant ou 2h après un repas**



Conservation dans sa **boîte d'origine**, à **température ambiante**, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

**A conserver hors de la portée des enfants.**

## Contactez rapidement ONCOTEL si

- Nausées et vomissements persistants
- Constipation ou présence de douleurs abdominales et/ou d'inefficacité des mesures laxatives
- Diarrhées importantes (≥4 selles par jour)
- Température auriculaire > 38.3°C ou < 36°C, ou égale à 38°C deux fois à une heure d'intervalle
- Signes hémorragiques (sang dans les selles, hématomes (bleus), saignements de nez)
- prise de poids rapide et inattendue (signe d'oedèmes)
- Toux ou essoufflements persistants

## Conseils



Ne pas couper les comprimés, ni les écraser



Se laver soigneusement les mains **avant et après** chaque prise



Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement

Utiliser une méthode de contraception efficace en cas de rapports sexuels avec une femme enceinte ou susceptible de l'être



Rapportez à l'officine les médicaments et emballages non utilisés



**N'arrêtez jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin spécialiste**



En cas de **souillure** des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge **rapidement et séparément**, en machine à **température élevée** (60-90°C)



Si vous avez oublié une prise de médicament :

Il reste + de **16h** avant la prochaine prise

→ Prenez la dose oubliée



Il reste - de **16h** avant la prochaine prise

→ Ne prenez pas la dose oubliée

## Prévention et gestion des principaux effets indésirables

	Nausées et vomissements	En cas de vomissements : Fractionner l'alimentation en plusieurs petits repas. Préférer les plats froids sans odeur aux préparations trop grasses et épicées Ne pas reprendre la prise si vomissements
	Constipation	En cas de constipation : Penser à vous hydrater. Boire au minimum 1.5 l/jour : jus de fruits, eau d'Hépar... Consommer des légumes et des fruits
	Diarrhées	En cas de diarrhées : Privilégier pâtes, riz, pommes de terre, carottes cuites, banane, gelée de coing... Hydratez vous régulièrement (bouillon de légumes, tisane, coca dégazé, eau minérale...)
	Leucopénie : baisse des globules blancs, Neutropénie : baisse des neutrophiles, risque d'infections	Surveiller les signes d'infections (fièvre, toux, brûlures urinaires) Limiter les contacts avec les personnes malades, lavage des mains, désinfection des plaies, hygiène buccale Recommander la vaccination antigrippale et antipneumococcique
	Thrombopénie : baisse des plaquettes	Prudence avec anti-inflammatoires, aspirine, anticoagulants
	Œdème des membres, douleurs dans les jambes	Alimentation à faible teneur en sel, éviter les vêtements serrés, surveiller son poids, élever les pieds en position assise
	Modification de la couleur de la peau et des cheveux Perte de cheveux / cheveux fragilisés	
	Toux, dyspnée	Surveiller l'apparition de symptômes
	Fièvre	
	Fatigue	Adapter son mode de vie tout en restant actif, se fixer des priorités et des moments de repos