

Interactions médicamenteuses

Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin et à votre pharmacien.



-> Interactions médicamenteuses :

- Gaviscon, Carbolevure, Smecta : intervalle de 2 heures avec Cabometryx
- Antifongiques azolés
- Colchicine
- Sitagliptine, ...



-> Interactions avec les plantes (tisanes, gélules, huiles essentielles, ...) :

A éviter : pamplemousse, millepertuis, curcuma, aloe vera, corossol, canneberge, échinacée, fenouil, hibiscus, ginseng, menthe poivrée, propolis (liste non exhaustive)




Ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.

Contacts



Oncotel : 03.81.47.99.99

Nom du pharmacien (hôpital):

Disponible uniquement
en
pharmacie de ville 

Fiche patient

CABOMETRYX®

Cabozantinib

C'est une thérapie ciblée indiquée dans le traitement du cancer du rein

Présentation en flacon de 30 comprimés

Il existe 3 dosages :
20 / 40 / 60mg



Cette fiche ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire

Cette fiche a été validée par l'équipe médicale d'oncologie

Posologie / Plan de prise

En 1 prise par jour, tous les jours à la même heure, avec un grand verre d'eau, 1h avant ou 2h après un repas



Conservation dans sa **boîte d'origine**, à **température ambiante**, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

A conserver hors de la portée des enfants.

Contactez rapidement ONCOTEL si

- Nausées et vomissements persistants
- Diarrhées importantes (≥ 4 selles par jour)
- Douleurs buccales trop importantes empêchant une alimentation normale
- Signes d'hypertension (Maux de tête, bourdonnements d'oreille et/ou vertiges)
- Syndrome main-pied gênant au quotidien
- Signes hémorragiques (sang dans les selles, hématomes (bleus), saignements de nez)

Conseils



Ne pas couper, mâcher, croquer ou écraser les comprimés



Se laver soigneusement les mains **avant et après** chaque prise



Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement

Utiliser une méthode de contraception efficace en cas de rapports sexuels avec une femme enceinte ou susceptible de l'être



Rapportez à l'officine les médicaments et emballages non utilisés



N'arrêtez jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin spécialiste



En cas de **souillure** des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge **rapidement et séparément**, en machine à **température élevée** (60-90°C)



Si vous avez oublié une prise de médicament :



Il reste + de 12h avant la prochaine prise



Il reste - de 12h avant la prochaine prise

➔ Prenez la dose oubliée

➔ Ne prenez pas la dose oubliée

Prévention et gestion des principaux effets indésirables

	Nausées et vomissements	En cas de vomissements : Fractionner l'alimentation en plusieurs petits repas. Préférer les plats froids sans odeur aux préparations trop grasses et épicées. Ne pas reprendre la prise si vomissements
	Diarrhées	En cas de diarrhées : Privilégier pâtes, riz, pommes de terre, carottes cuites, banane, gelée de coing... Hydratez vous régulièrement (bouillon de légumes, tisane, coca dégazé, eau minérale...)
	Mucites (inflammation de la bouche)	Adapter votre brossage de dents : Brosse souple, dentifrice doux (sans menthol), bain de bouche préventif
	Hypertension artérielle	Mesurer régulièrement la tension, savoir reconnaître les signes d'hypertension : maux de tête, troubles de la vision, bourdonnements d'oreilles Limiter la consommation de sel
	Syndrome main-pied	Eviter les chaussures serrées, les frottements Utiliser un savon doux et une crème hydratante Surveiller la surinfection
	Altération de la cicatrisation	Avertir le médecin de la prise du traitement avant toute intervention programmée ou urgente
	Dysphonie	Eviter le tabac, les poussières, le froid, boire régulièrement pour hydrater les cordes vocales, repos vocal
	Saignements	Prudence avec les anti-inflammatoires, aspirine, anticoagulants
	Fatigue	Adapter son mode de vie tout en restant actif, se fixer des priorités et des moments de repos
	Bilan hépatique et thyroïdien perturbés	Surveillance biologique et montrer le résultat à votre médecin

Pour plus de renseignements, consulter la notice du médicament.