

Interactions médicamenteuses

Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin et à votre pharmacien.

-> Interactions médicamenteuses :



- Gaviscon, Carbolevure, Smecta : intervalle de 2 heures avec Endoxan et Xeloda
- Anticoagulants oraux
- Allopurinol, ...

-> Interactions avec les plantes (tisanes, gélules, huiles essentielles, ...) :



A éviter : pamplemousse, millepertuis, thé vert, gingembre, hibiscus, échinacée, camomille, ginseng, thym, valériane, verveine, curcuma, aloe vera, chardon-marie (liste non exhaustive)




Ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.

Contacts



Oncotel : 03.81.47.99.99

Nom du pharmacien (hôpital):

Disponible uniquement
en
pharmacie de ville 

Fiche patient

ENDOXAN®-

XELODA®

Cyclophosphamide-Capécitabine

C'est une chimiothérapie indiquée dans le traitement de plusieurs cancers digestifs -métastatiques.

Endoxan :

Présentation en boîte de 50 comprimés (plaquettes de 10)

Il existe 1 dosage :
50mg

Xeloda :

Présentation en boîte de 120 comprimés (plaquettes de 10)

Il existe 2 dosages :
150mg / 500mg



Cette fiche ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire

Cette fiche a été validée par l'équipe médicale d'oncologie

Posologie / Plan de prise

Endoxan se prend en **1 prise par jour**, tous les jours à la même heure, avec un grand verre d'eau **le matin à jeun**

Xeloda se prend en **2 prises par jour matin et soir** à 12h d'intervalle, avec un grand verre d'eau, **dans les 30 minutes suivant le repas**

Association fréquente au **Kardegic** 1 sachet / jour



Conservation dans sa **boîte d'origine**, à **température ambiante**, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

A conserver hors de la portée des enfants.

Contactez rapidement ONCOTEL si

- Nausées et vomissements persistants
- Diarrhées importantes (≥4 selles par jour)
- Douleurs buccales trop importantes empêchant une alimentation normale
- Perte de poids rapide et importante (≥5% du poids initial)
- Troubles cutanés et syndrome main-pied gênant au quotidien
- Douleurs cardiaques, si importantes : contactez le 15 (SAMU)
- Température auriculaire > 38.3°C ou < 36°C, ou égale à 38°C deux fois à une heure d'intervalle
- Signes hémorragiques (sang dans les selles, hématomes (bleus), saignements de nez)

Conseils



Ne pas couper, mâcher, croquer ou écraser les comprimés



Se laver soigneusement les mains **avant et après** chaque prise



Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement

Utiliser une méthode de contraception efficace en cas de rapports sexuels avec une femme enceinte ou susceptible de l'être



Rapportez à l'officine les médicaments et emballages non utilisés



N'arrêtez jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin spécialiste



En cas de **souillure** des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge **rapidement et séparément**, en machine à **température élevée** (60-90°C)











Xeloda : **dosage de l'uracilémié** pour rechercher un **déficit en DPD** avant début du traitement



Si vous avez oublié une prise de médicament :

- **ne prenez pas la dose oubliée**
- **prenez la dose habituelle le jour suivant**
- noter l'oubli

Prévention et gestion des principaux effets indésirables

	Nausées et vomissements	En cas de vomissements : Fractionner l'alimentation en plusieurs petits repas. Préférer les plats froids sans odeur aux préparations trop grasses et épicées Ne pas reprendre la prise si vomissements
	Diarrhées	En cas de diarrhées : Privilégier pâtes, riz, pommes de terre, carottes cuites, banane, gelée de coing... Hydratez vous régulièrement (bouillon de légumes, tisane, coca dégazé, eau minérale...)
	Gingivites (inflammation des gencives), Stomatites (inflammation de l'intérieur de la bouche)	Adapter votre brossage de dents : Brosse souple, dentifrice doux (sans menthol), bain de bouche préventif
	Perte d'appétit	Fractionner les repas, discuter compléments nutritionnels à la prochaine consultation
	Fatigue	Adapter son mode de vie tout en restant actif, se fixer des priorités et des moments de repos
	Cutané - éruption, acné, sécheresse de la peau, photosensibilité, syndrome main pied	Eviter les chaussures serrées, les frottements et l'eau trop chaude Eviter les expositions au soleil et utiliser un écran solaire total Utiliser un savon doux et une crème hydratante. Surveiller la surinfection
	Cardiaque	
	Leucopénie : baisse des globules blancs, Neutropénie : baisse des neutrophiles, risque d'infections	Surveiller les signes d'infections (fièvre, toux, brûlures urinaires) Limiter les contacts avec les personnes malades, lavage des mains, désinfection des plaies, hygiène buccale Recommander la vaccination antigrippale et antipneumococcique
	Thrombopénie : baisse des plaquettes	Prudence avec anti-inflammatoires, aspirine, anticoagulants

Pour plus de renseignements, consulter la notice du médicament.