

Interactions médicamenteuses

Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin et à votre pharmacien.

-> Interactions médicamenteuses :



- Gaviscon, Carbolevure, Smecta : intervalle de 2 heures avec Tyverb et Xeloda
- Anticoagulants oraux
- Allopurinol, ...

-> Interactions avec les plantes (tisanes, gélules, huiles essentielles, ...) :



A éviter : pamplemousse, millepertuis, échinacée, camomille, gingembre, ginseng, thym, valériane, verveine, curcuma, aloe vera, chardon marie, sauge (liste non exhaustive)




Ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.

Contacts



Oncotel : 03.81.47.99.99

Nom du pharmacien (hôpital):

Disponible uniquement
en
pharmacie de ville 

Fiche patient

TYVERB[®]-

XELODA[®]

Lapatinib-Capécitabine

Association indiquée dans le traitement du cancer du sein

Tyverb :

Présentation par boîtes de 30 comprimés (plaquettes de 10)

Il existe 1 dosage :
250mg

Xeloda :

Présentation par boîtes de 120 comprimés (plaquettes de 10)

Il existe 2 dosages :
150mg / 500mg



Cette fiche ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire


Cette fiche a été validée par l'équipe médicale d'oncologie

Posologie / Plan de prise

Tyverb se prend en **1 prise par jour, tous les jours à la même heure**, avec un grand verre d'eau, **1 heure avant ou 1h après un repas**



Xeloda se prend en **2 prises par jour matin et soir à 12h d'intervalle, tous les jours à la même heure**, avec un grand verre d'eau dans les 30 minutes suivant le repas



Conservation dans sa **boîte d'origine**, à **température ambiante**, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.
A conserver hors de la portée des enfants.

Contactez rapidement ONCOTEL si

- Nausées et vomissements persistants
- Diarrhées importantes (≥4 selles par jour)
- Douleurs buccales trop importantes empêchant une alimentation normale
- Perte de poids rapide et importante (≥5% du poids initial)
- Troubles cutanés gênant au quotidien
- Douleurs cardiaques, si importantes : contactez le 15 (SAMU)

Conseils



Ne pas couper, mâcher, croquer ou écraser les comprimés



Se laver soigneusement les mains **avant et après** chaque prise



Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement

Utiliser une méthode de contraception efficace en cas de rapports sexuels avec une femme enceinte ou susceptible de l'être



Rapportez à l'officine les médicaments et emballages non utilisés



N'arrêtez jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin spécialiste



En cas de **souillure** des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge **rapidement et séparément**, en machine à **température élevée** (60-90°C)



Xeloda : **dosage de l'uracilémie** pour rechercher un **déficit en DPD** avant début du traitement



Si vous avez oublié une prise de médicament :

- **ne prenez pas la dose oubliée**
- **prenez la dose habituelle le jour suivant**
- noter l'oubli

Prévention et gestion des principaux effets indésirables



Nausées et vomissements

En cas de vomissements : Fractionner l'alimentation en plusieurs petits repas. Préférer les plats froids sans odeur aux préparations trop grasses et épicées
Ne pas reprendre la prise si vomissements



Diarrhées

En cas de diarrhées : Privilégier pâtes, riz, pommes de terre, carottes cuites, banane, gelée de coing... Hydratez vous régulièrement (bouillon de légumes, tisane, coca dégazé, eau minérale...)



Gingivites (inflammation des gencives), Stomatites (inflammation de l'intérieur de la bouche)

Adapter votre brossage de dents : Brosse souple, dentifrice doux (sans menthol), bain de bouche préventif



Perte d'appétit

Fractionner les repas, discuter compléments nutritionnels à la prochaine consultation



Fatigue

Adapter son mode de vie tout en restant actif, se fixer des priorités et des moments de repos



Cutané - éruption, acné, sécheresse de la peau, photosensibilité, syndrome main pied

Eviter les chaussures serrées, les frottements et l'eau trop chaude
Eviter les expositions au soleil et utiliser un écran solaire total
Utiliser un savon doux et une crème émolliente. Surveiller la surinfection



Cardiaque

Pour plus de renseignements, consulter la notice du médicament.