

Qu'est-ce que chlorambucil ?

C'est une chimiothérapie anticancéreuse et immunosuppressive indiquée dans le traitement de **leucémies** et **lymphomes**.

Où puis-je me procurer mon traitement ?

Disponible en **pharmacie de ville**

Comment le conserver ?

Dans sa **boîte d'origine**, à **température ambiante**, à l'abri de l'humidité et de la chaleur

Conserver hors de la portée des enfants

Comment dois-je le prendre ?

- La posologie est strictement personnelle
- L'administration se fait en **1 prise** par jour, à jeun
- Essayer de prendre les gélules à la même heure tous les jours



Si vous avez oublié une prise de médicament :

- o **ne prenez pas la dose oubliée**
- o **prenez la dose habituelle le jour suivant**
- o noter l'oubli



Consignes générales



Ne pas ouvrir les gélules



Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement

Utiliser une méthode de contraception efficace **pendant le traitement et jusqu'à 1 mois après la fin du traitement**



Se laver soigneusement les mains **avant et après** chaque prise



Rapportez à l'officine les médicaments et emballages non utilisés



N'arrêter jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin spécialiste



Eviter l'utilisation de médicaments à base de **plantes** (millepertuis) et éviter la consommation de **pampleousse** (jus ou pulpe) qui peuvent interagir avec les médicaments



En cas de **souillure** des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge **rapidement et séparément**, en machine à **température élevée** (60-90°C)

Brochure information Patient

CHLORAMINOPHENE® Chlorambucil 2 mg Gélules



Mieux connaître son traitement

Contacts

Médecin : Dr _____

03.81.66.82.32



Cette fiche ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire.

Cette fiche a été validée par l'équipe médicale d'hématologie

CHLORAMINOPHENE® Chlorambucil

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

Principaux effets indésirables potentiels

Digestif

- Nausées / vomissements

Allergie cutanée (rougeur, démangeaison)

Fatigue

Troubles hématologiques (anémie, thrombopénie, neutropénie)

Prévention



Faire plusieurs repas légers et éviter les aliments frits, épicés et gras



Ne pas reprendre la prise si vomissements



Utiliser un savon doux et une crème émolliente
Surveiller la surinfection



En cas de rougeur et/ou de démangeaison, contacter un médecin



Eviter les expositions au soleil et utiliser un écran solaire total



Adapter son mode de vie tout en restant actif, se fixer des priorités et des moments de repos



Limitier les contacts avec les personnes malades
Surveillance biologique et montrer le résultat à votre médecin



Si vous ressentez des **effets non mentionnés**, n'hésitez pas à en parler à votre médecin.