

Interactions médicamenteuses

Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin et à votre pharmacien.



-> Interactions médicamenteuses :

- Gaviscon, Carbolevure, Smecta : intervalle de 2 heures avec Tafinlar
- Voriconazole, clarithromycine, amiodarone, verapamil, ciclosporine, ...

-> Interactions avec les plantes (tisanes, gélules, huiles essentielles, ...) :



A éviter : pamplemousse, millepertuis, thé vert, réglisse, chardon-marie, curcuma, aloe vera, corossol, canneberge, échinacée, fenouil, hibiscus, ginseng, menthe poivrée, gingembre, gingko (liste non exhaustive)




Ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.

Contacts



Oncotel : 03.81.47.99.99

Nom du pharmacien (hôpital):

Disponible uniquement
en
pharmacie de ville 

Fiche patient

TAFINLAR®
Dabrafenib

C'est une thérapie ciblée indiquée dans le traitement du mélanome

Présentation par flacon de 120 gélules

Il existe 2 dosages :
50/75mg



Cette fiche ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire

Cette fiche a été validée par l'équipe médicale d'oncologie

Posologie / Plan de prise

En **2 prises par jour, à 12h d'intervalle**, tous les jours à la **même heure**; avec un grand verre d'eau, **au moins 1h avant ou 2h après un repas**



Conservation dans sa **boîte d'origine**, à **température ambiante**, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

A conserver hors de la portée des enfants.

Contactez rapidement
ONCOTEL si

- Nausées et vomissements persistants
- Diarrhées importantes (≥4 selles par jour)
- Troubles cutanés gênant au quotidien
- Syndrome main-pied gênant au quotidien
- Toux ou essoufflements persistants

Conseils



Ne pas **ouvrir, écraser, ni mâcher** les gélules



Se laver soigneusement les mains **avant et après** chaque prise

Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement



Utiliser une méthode de contraception efficace en cas de rapports sexuels avec une femme enceinte ou susceptible de l'être



Rapportez à l'officine les médicaments et emballages non utilisés



N'arrêtez jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin spécialiste



En cas de **souillure** des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge **rapidement et séparément**, en machine à **température élevée** (60-90°C)



Si vous avez oublié une prise de médicament :

Il reste + **de 6h** avant la prochaine prise

→ Prenez la dose oubliée



Il reste - **de 6h** avant la prochaine prise

→ Ne prenez pas la dose oubliée

Prévention et gestion des principaux effets indésirables

	Nausées et vomissements	En cas de vomissements : Fractionner l'alimentation en plusieurs petits repas. Privilégier les plats froids sans odeur aux préparations trop grasses et épicées. Ne pas reprendre la prise si vomissements
	Diarrhées	En cas de diarrhées : Privilégier pâtes, riz, pommes de terre, carottes cuites, banane, gelée de coing... Hydratez vous régulièrement (bouillon de légumes, tisane, coca dégazé, eau minérale...)
	Cutané - éruption, acné, sècheresse de la peau, photosensibilité	Eviter les frottements et l'eau trop chaude Eviter les expositions au soleil et utiliser un écran solaire total Utiliser un savon doux et une crème hydratante Surveiller la surinfection
	Syndrome mains pieds	Eviter les chaussures serrées, les frottements Utiliser un savon doux et une crème émoulliente Surveiller la surinfection
	Perte de cheveux / cheveux fragilisés	Se laver les cheveux à distance de la prise des médicaments, se couper les cheveux courts. Envisager une prothèse capillaire
	Douleurs musculaires, douleurs articulaires,	Eviter les mouvements répétitifs et les efforts physiques importants, bien s'hydrater (1,5L d'eau/jour)
	Fatigue	Adapter son mode de vie tout en restant actif, se fixer des priorités et des moments de repos
	Toux	Surveiller l'apparition de symptômes

Pour plus de renseignements, consulter la notice du médicament.