

Interactions médicamenteuses

Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin et à votre pharmacien.

-> Interactions médicamenteuses :



- Gaviscon, Carbolevure, Smecta : intervalle de 2 heures avec Vizimpro
- Laroxyl, diltiazem, paroxetine, miansérine, venlafaxine,
- Amiodarone, diltiazem, ...

-> Interactions avec les plantes (tisanes, gélules, huiles essentielles, ...) :



A éviter : pamplemousse, millepertuis, échinacée, camomille, hibiscus, menthe poivrée, verveine, curcuma, aloe vera, harpagophytum (liste non exhaustive)



Ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.

Contacts



Oncotel : 03.81.47.99.99

Nom du pharmacien (hôpital):

Disponible uniquement
en
pharmacie hospitalière



Fiche patient

VIZIMPRO[®]

Dacomitinib

C'est une thérapie ciblée qui inhibe la prolifération de lignées cellulaires ayant une mutation spécifique

Présentation en boîte de 30 comprimés

Il existe 3 dosages :
15/30/45mg



Cette fiche ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire

Cette fiche a été validée par l'équipe médicale d'oncologie

Posologie / Plan de prise

En **1 prise par jour**, tous les jours à la même heure, avec un grand verre d'eau, **pendant ou en dehors des repas**



Conservation dans sa **boîte d'origine**, à **température ambiante**, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

A conserver hors de la portée des enfants.

Contactez rapidement ONCOTEL si

- Nausées et vomissements persistants
- Diarrhées importantes (≥4 selles par jour)
- Douleurs buccales trop importantes empêchant une alimentation normale
- Perte de poids rapide et importante (≥5% du poids initial)
- Troubles cutanés gênant au quotidien
- Douleurs à l'œil, larmoiement ou rougeurs, vision floue ou sensibilité à la lumière
- Apparition de symptômes pulmonaires

Conseils



Ne pas couper les comprimés, ni les écraser



Se laver soigneusement les mains **avant et après** chaque prise



Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement

Utiliser une méthode de contraception efficace en cas de rapports sexuels avec une femme enceinte ou susceptible de l'être



Rapportez à l'officine les médicaments et emballages non utilisés



N'arrêtez jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin spécialiste













En cas de **souillure** des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge **rapidement et séparément**, en machine à **température élevée** (60-90°C)



Si vous avez oublié une prise de médicament :

- **ne prenez pas la dose oubliée**
- **prenez la dose habituelle le jour suivant**
- noter l'oubli

Prévention et gestion des principaux effets indésirables

	Nausées, vomissements	En cas de vomissements : Fractionner l'alimentation en plusieurs petits repas. Préférer les plats froids sans odeur aux préparations trop grasses et épicées Ne pas reprendre la prise si vomissements
	Diarrhées	En cas de diarrhées : Privilégier pâtes, riz, pommes de terre, carottes cuites, banane, gelée de coing... Hydratez vous régulièrement (bouillon de légumes, tisane, coca dégazé, eau minérale...)
	Stomatites (inflammation de l'intérieur de la bouche)	Adapter votre brossage de dents : Brosse souple, dentifrice doux (sans menthol), bain de bouche préventif, substituts salivaires
	Perte d'appétit	Fractionner les repas, discuter compléments nutritionnels à la prochaine consultation
	Sècheresse cutanée	Eviter les frottements et l'eau trop chaude Eviter les expositions au soleil et utiliser un écran solaire total Utiliser un savon doux et une crème hydratante Surveiller la surinfection
	Ongles (onycholyse, onychodystrophie et paronychie)	Garder les doigts et les orteils propres, les ongles coupés. Evitez les manucures agressives et porter des chaussures confortables
	Troubles oculaires (conjonctivite, démangeaisons, larmoiements, sécheresse oculaire)	Eviter une atmosphère trop sèche ou enfumée, les longues durées devant les écrans
	Maladie pulmonaire interstitielle	Surveillance clinique
	Fatigue	Adapter son mode de vie tout en restant actif, se fixer des priorités et des moments de repos
	Perturbation du bilan biologique	Surveillance biologique et montrer le résultat à votre médecin