

Interactions médicamenteuses

Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin et à votre pharmacien.

-> Interactions médicamenteuses :



- Gaviscon, Carbolevure, Smecta : intervalle de 2 heures avec Braftovi
- Voriconazole, clarithromycine, amiodarone, verapamil, atorvastatine, ciclosporine, ...

-> Interactions avec les plantes (tisanes, gélules, huiles essentielles, ...) :



A éviter : pamplemousse, millepertuis, échinacée, camomille, gingembre, ginseng, thym, valériane, verveine, curcuma, aloe vera, chardon-marie (liste non exhaustive)



Ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.

Contacts



Oncotel : 03.81.47.99.99

Nom du pharmacien (hôpital):

Disponible uniquement en pharmacie hospitalière



Fiche patient

BRAFTOVI®

encorafenib

C'est une thérapie ciblée indiquée dans le traitement du cancer colorectal métastatique en association avec Cetuximab

Braftovi :

Il est présenté par flacon de 28 ou 42 gélules

Il existe 2 dosages :

50/75mg



Cette fiche ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire

Cette fiche a été validée par l'équipe médicale d'oncologie

Posologie / Plan de prise

En **une prise** par jour **tous les jours à la même heure**, avec un grand verre d'eau, **pendant ou en dehors des repas**.

La dose recommandée d'encorafenib est de **300 mg (quatre gélules de 75 mg)**

La posologie est strictement individuelle et peut être adaptée suivant la tolérance

Conservation dans sa **boîte d'origine**, à **température ambiante**, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

A conserver hors de la portée des enfants.

Contactez rapidement ONCOTEL si

- Nausées et vomissements persistants
- Constipation ou présence de douleurs abdominales et/ou d'inefficacité des mesures laxatives
- Diarrhées importantes (≥4 selles par jour)
- Perte de poids rapide et importante (≥5% du poids initial)
- Troubles cutanés gênant au quotidien
- Si palpitation
- Température auriculaire > 38.3°C ou < 36°C, ou égale à 38°C deux fois à une heure d'intervalle

Conseils



Ne pas ouvrir les gélules



Se laver soigneusement les mains **avant et après** chaque prise



Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement

Utiliser une méthode de contraception efficace en cas de rapports sexuels avec une femme enceinte ou susceptible de l'être



Rapportez à l'officine les médicaments et emballages non utilisés



N'arrêtez jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin spécialiste



En cas de **souillure** des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge **rapidement et séparément**, en machine à **température élevée** (60-90°C)



Si vous avez oublié une prise de médicament :

Il reste + de **12h** avant la prochaine prise












→ Prenez la dose oubliée



Il reste - de **12h** avant la prochaine prise

→ Ne prenez pas la dose oubliée

Prévention et gestion des principaux effets indésirables

	Nausées et vomissements	En cas de vomissements : Fractionner l'alimentation en plusieurs petits repas. Préférer les plats froids sans odeur aux préparations trop grasses et épicées. Ne pas reprendre la prise si vomissements
	Constipation	En cas de constipation : Penser à vous hydrater. Boire au minimum 1.5 l/jour : jus de fruits, eau d'Hépar... Consommer des légumes et des fruits
	Diarrhées	En cas de diarrhées : Privilégier pâtes, riz, pommes de terre, carottes cuites, banane, gelée de coing... Hydratez vous régulièrement (bouillon de légumes, tisane, coca dégazé, eau minérale...)
	Perte d'appétit	Fractionner les repas, discuter compléments nutritionnels à la prochaine consultation
	Cutané - éruption, acné, sècheresse de la peau, photosensibilité	Eviter les frottements et l'eau trop chaude Eviter les expositions au soleil et utiliser un écran solaire total Utiliser un savon doux et une crème émolliente Surveiller la surinfection
	Neuropathie : fourmillements, perte de la sensibilité, dans les mains ou dans les pieds, faiblesse musculaire	Informez votre médecin dès la survenue de symptômes
	Maux de tête	Bien s'hydrater : 1,5 L d'eau par jour
	Trouble du rythme cardiaque	Surveillance cardiaque
	Toxicité musculaire - Augmentation des CPK - Myalgie / Arthralgie	Eviter les mouvements répétitifs et les efforts physiques importants, bien s'hydrater (1,5L d'eau/jour) Surveillance biologique et montrer le résultat à votre médecin,
	Fatigue	Adapter son mode de vie tout en restant actif, se fixer des priorités et des moments de repos
	Fièvre	