

Interactions médicamenteuses

Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin et à votre pharmacien.



-> Interactions médicamenteuses :

- Gaviscon, Carbolevure, Smecta : intervalle de 2 heures avec Xtandi
- Tramadol
- Clarithomycine, ...

-> Interactions avec les plantes (tisanes, gélules, huiles essentielles, ...) :



A éviter : pamplemousse, millepertuis, échinacée, camomille, gingembre, ginseng, thym, valériane, verveine, curcuma, aloe vera, chardon-marie, hibiscus, aubépine, carambole, thé vert, menthe poivrée (liste non exhaustive)




Ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.

Contacts



Oncotel : 03.81.47.99.99

Nom du pharmacien (hôpital):

Disponible uniquement
en
pharmacie de ville 

Fiche patient

XTANDI®
enzalutamide

C'est une hormonothérapie indiquée dans le traitement du cancer de la prostate

Présentation en boîte de 114 comprimés (plaquettes de 28)

Il existe 1 dosage :
40mg



Cette fiche ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire

Cette fiche a été validée par l'équipe médicale d'oncologie


Posologie / Plan de prise

En 1 prise par jour, tous les jours à la **même heure** avec un grand verre d'eau **pendant ou en dehors des repas**.



Prednisone ou prednisolone à prendre en **2 prises par jour** (matin et soir)

Ne jamais arrêter Prednisone ou Prednisolone **sans avis médical**

 **Ne jamais arrêter** la castration chimique (analogue de la LH-RH : **DECAPEPTYL®** ou **ENANTONE®** ou **ELIGARD®** ou **ZOLADEX®** ou **FIRMAGON®**..etc)

Conservation dans sa **boîte d'origine**, à **température ambiante**, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

A conserver hors de la portée des enfants.

Contactez rapidement
ONCOTEL si

- En cas de survenue de convulsions, contacter le 15

Conseils



Ne pas couper, mâcher, croquer ou écraser les comprimés



Se laver soigneusement les mains **avant et après** chaque prise

Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement



Utiliser une méthode de contraception efficace en cas de rapports sexuels avec une femme enceinte ou susceptible de l'être



Rapportez à l'officine les médicaments et emballages non utilisés



N'arrêtez jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin spécialiste



En cas de **souillure** des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge **rapidement et séparément**, en machine à **température élevée** (60-90°C)



Si vous avez oublié une prise de médicament :

- **ne prenez pas la dose oubliée**
- **prenez la dose habituelle le jour suivant**
- noter l'oubli

Prévention et gestion des principaux effets indésirables



Céphalées modérées
Bouffées de chaleur

Bien s'hydrater : 1,5 L d'eau par jour



Fatigue

Adapter son mode de vie tout en restant actif, se fixer des priorités et des moments de repos



Risque de convulsions (rare)