

## Interactions médicamenteuses

Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin et à votre pharmacien.

### -> Interactions médicamenteuses :



- Gaviscon, Carbolevure, Smecta : intervalle de 2 heures avec Erdafitinib
- Rifampicine, carbamazépine
- Antifongiques azolés
- Verapamil, ...

### -> Interactions avec les plantes (tisanes, gélules, huiles essentielles, ...) :



A éviter : pamplemousse, millepertuis, échinacée, camomille, gingembre, ginseng, thym, valériane, verveine, curcuma, aloe vera, harpagophytum (liste non exhaustive)



Ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.

## Contacts



Oncotel : 03.81.47.99.99

Nom du pharmacien (hôpital):

---

Disponible uniquement  
en  
pharmacie hospitalière



## Fiche patient

# Erdafitinib

C'est une thérapie ciblée indiquée dans le traitement du cancer de la vessie métastatique ou inopérable

Présentation en boîte de 30 comprimés

Il existe 3 dosages :  
3/4/5mg



*Cette fiche ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire*

Cette fiche a été validée par l'équipe médicale d'oncologie

## Posologie / Plan de prise

En **1 prise par jour**, tous les jours à la même heure, avec un grand verre d'eau, **pendant ou en dehors des repas**

Posologie initiale à **8 mg/jour** en une prise pendant **14 jours**, puis adaptation de la posologie selon la phosphorémie



Conservation dans sa **boîte d'origine**, à **température ambiante**, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

**A conserver hors de la portée des enfants.**

## Contactez rapidement ONCOTEL si

- Douleurs buccales trop importantes empêchant une alimentation normale
- Sècheresse buccale, cutanée et oculaire gênant au quotidien
- Douleurs à l'œil, larmoiement ou rougeurs, vision floue ou sensibilité à la lumière

## Conseils



Ne pas couper les comprimés, ni les écraser



Se laver soigneusement les mains **avant et après** chaque prise



Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement

Utiliser une méthode de contraception efficace en cas de rapports sexuels avec une femme enceinte ou susceptible de l'être



Rapportez à l'officine les médicaments et emballages non utilisés



**N'arrêtez jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin spécialiste**



En cas de **souillure** des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge **rapidement et séparément**, en machine à **température élevée** (60-90°C)



Si vous avez oublié une prise de médicament :

- **Prenez la dose oubliée dès que possible**
- **Puis prenez la dose habituelle le jour suivant**

## Prévention et gestion des principaux effets indésirables

	Bouche sèche Mycose buccale	Adapter votre brossage de dents : Brosse souple, dentifrice doux (sans menthol), bain de bouche préventif, substituts salivaires
	Sècheresse cutanée	Eviter les frottements et l'eau trop chaude Eviter les expositions au soleil et utiliser un écran solaire total Utiliser un savon doux et une crème hydratante Surveiller la surinfection
	Ongles (onycholyse : décollement de l'ongle, onychodystrophie : déformation de l'ongle et paronychie : inflammation des tissus autour de l'ongle)	Garder les doigts et les orteils propres, les ongles coupés. Evitez les manucures agressives et porter des chaussures confortables
	Troubles oculaires (conjonctivite, démangeaisons, larmoiements, sèche-cuillère oculaire)	Eviter une atmosphère trop sèche ou enfumée, les longues durées devant les écrans
	Suivi biologique	Selon avis médical : suivi de la NFS, bilan hépatique et rénal, phosphorémie