

## Interactions médicamenteuses

Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin et à votre pharmacien.

### -> Interactions médicamenteuses :



- Gaviscon, Carbolevure, Smecta : intervalle de 2 heures avec Afinitor
- Perindopril, enalapril, captopril, fosinopril, tadalapril (liste non exhaustive), ...

### -> Interactions avec les plantes (tisanes, gélules, huiles essentielles, ...) :



A éviter : pamplemousse, millepertuis, échinacée, camomille, gingembre, ginseng, thym, valériane, verveine, curcuma, aloe vera, chardon marie (liste non exhaustive)



**Ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.**


## Contacts



Oncotel : 03.81.47.99.99

Nom du pharmacien (hôpital):

---

Disponible uniquement  
en  
pharmacie de ville 

## Fiche patient

# AFINITOR®

## Évérolimus

C'est une thérapie ciblée indiquée dans le traitement :

- du cancer du sein en association à l'exemestane AROMASINE®
- du cancer du rein
- des tumeurs neuro-endocrines

Présentation par boîtes de 30 comprimés (plaquettes de 10)

Il existe 3 dosages :  
2,5 / 5 / 10mg



*Cette fiche ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire*

Cette fiche a été validée par l'équipe médicale d'oncologie

## Posologie / Plan de prise

**En 1 prise par jour, tous les jours à la même heure, avec un grand verre d'eau, pendant ou en dehors des repas**



**Cancer du sein : association à AROMASINE® : 1 comprimé 1 fois par jour après un repas**

Conservation dans sa **boîte d'origine**, à **température ambiante**, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

**A conserver hors de la portée des enfants.**

## Contactez rapidement ONCOTEL si

- Nausées et vomissements persistants
- Diarrhées importantes (≥4 selles par jour)
- Douleurs buccales trop importantes empêchant une alimentation normale
- Température auriculaire > 38.3°C ou < 36°C, ou égale à 38°C deux fois à une heure d'intervalle
- Toux ou essoufflements persistants

## Conseils



**Ne pas couper, mâcher, croquer ou écraser** les comprimés



Se laver soigneusement les mains **avant et après** chaque prise



Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement

Utiliser une méthode de contraception efficace en cas de rapports sexuels avec une femme enceinte ou susceptible de l'être



Rapportez à l'officine les médicaments et emballages non utilisés



**N'arrêtez jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin spécialiste**






En cas de **souillure** des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge **rapidement et séparément**, en machine à **température élevée** (60-90°C)



Si vous avez oublié une prise de médicament :

- **ne prenez pas la dose oubliée**
- **prenez la dose habituelle le jour suivant**
- noter l'oubli

## Prévention et gestion des principaux effets indésirables

	Nausées et vomissements	En cas de vomissements : Fractionner l'alimentation en plusieurs petits repas. Préférer les plats froids sans odeur aux préparations trop grasses et épicées. Ne pas reprendre la prise si vomissements
	Diarrhées	En cas de diarrhées : Privilégier pâtes, riz, pommes de terre, carottes cuites, banane, gelée de coing... Hydratez vous régulièrement (bouillon de légumes, tisane, coca dégazé, eau minérale...)
	Mucites (inflammation de la bouche)	Adapter votre brossage de dents : Brosse souple, dentifrice doux (sans menthol), bain de bouche préventif
	Leucopénie : baisse des globules blancs, Neutropénie : baisse des neutrophiles, risque d'infections	Surveiller les signes d'infections (fièvre, toux, brûlures urinaires) Limiter les contacts avec les personnes malades, lavage des mains, désinfection des plaies, hygiène buccale Recommander la vaccination antigrippale et antipneumococcique
	Toux, essoufflement	Surveiller l'apparition de symptômes
	Dyslipidémie Hyperglycémie	Surveillance biologique
	Fatigue	Adapter son mode de vie tout en restant actif, se fixer des priorités et des moments de repos

Pour plus de renseignements, consulter la notice du médicament.