

Interactions médicamenteuses

Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin et à votre pharmacien.

-> Interactions médicamenteuses :



- Gaviscon, Carbolevure, Smecta : intervalle de 2 heures avec Glivec
- Anticoagulants oraux
- Antifongiques azolés,

-> Interactions avec les plantes (tisanes, gélules, huiles essentielles, ...) :



A éviter : pamplemousse, millepertuis, échinacée, camomille, gingembre, ginseng, thym, valériane, verveine, curcuma, aloe vera (liste non exhaustive)




Ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.

Contacts



Oncotel : 03.81.47.99.99

Nom du pharmacien (hôpital):

Disponible uniquement
en
pharmacie de ville 

Fiche patient

GLIVEC®

Imatinib

C'est une thérapie ciblée indiquée dans le traitement :

- de la LMC ou LAL chromosome Ph+
- des tumeurs stromales gastro-intestinales
- du syndrome hyperéosinophilique et leucémie à éosinophiles
- des syndromes myéloprolifératifs ou myélodysplasiques
- du dermatofibrosarcome

Présentation en boîte de 30 ou 60 comprimés (plaquettes de 10)

Il existe 2 dosages :
100/ 400mg

Existe en générique




Cette fiche ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire

Cette fiche a été validée par l'équipe médicale d'oncologie

Posologie / Plan de prise

Avec un grand verre d'eau **pendant** un repas :
-1 prise/jour pour les doses **jusqu'à 600mg au cours** du plus gros **repas** de la journée
-2 prises/jour matin et soir pour les doses **supérieures à 600mg**



En cas de **difficultés de déglutition**, les comprimés peuvent être dispersés dans de l'eau ou du jus de pomme

Eviter de s'allonger immédiatement après la prise

Conservation dans sa **boîte d'origine**, à **température ambiante**, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

A conserver hors de la portée des enfants.

Contactez rapidement ONCOTEL si

- Nausées et vomissements persistants
- Diarrhées importantes (≥4 selles par jour)
- Troubles cutanés gênant au quotidien
- Température auriculaire > 38.3°C ou < 36°C, ou égale à 38°C deux fois à une heure d'intervalle
- Signes hémorragiques (sang dans les selles, hématomes (bleus), saignements de nez)
- Prise de poids rapide et inattendue (peut être signe d'oedèmes)
- Toux ou essoufflements persistants
- Douleurs à l'œil, larmoiement ou rougeurs, vision floue ou sensibilité à la lumière

Conseils



Ne pas couper, mâcher, croquer ou écraser les comprimés



Se laver soigneusement les mains **avant et après** chaque prise



Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement

Utiliser une méthode de contraception efficace en cas de rapports sexuels avec une femme enceinte ou susceptible de l'être



Rapportez à l'officine les médicaments et emballages non utilisés



N'arrêtez jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin spécialiste



En cas de **souillure** des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge **rapidement et séparément**, en machine à **température élevée** (60-90°C)



Si vous avez oublié une prise de médicament :

- **ne prenez pas la dose oubliée**
- **prenez la dose habituelle le jour suivant**
- noter l'oubli

Prévention et gestion des principaux effets indésirables

	Nausées et vomissements	En cas de vomissements : Fractionner l'alimentation en plusieurs petits repas. Préférer les plats froids sans odeur aux préparations trop grasses et épicées Ne pas reprendre la prise si vomissements
	Diarrhées	En cas de diarrhées : Privilégier pâtes, riz, pommes de terre, carottes cuites, banane, gelée de coing... Hydratez vous régulièrement (bouillon de légumes, tisane, coca dégazé, eau minérale...)
	Eruptions cutanées	Eviter les frottements et l'eau trop chaude Eviter les expositions au soleil et utiliser un écran solaire total Utiliser un savon doux et une crème hydratante Surveiller la surinfection
	Leucopénie : baisse des globules blancs, Neutropénie : baisse des neutrophiles, risque d'infections	Surveiller les signes d'infections (fièvre, toux, brûlures urinaires) Limiter les contacts avec les personnes malades, lavage des mains, désinfection des plaies, hygiène buccale Recommander la vaccination antigrippale et antipneumococcique
	Thrombopénie : baisse des plaquettes	Prudence avec anti-inflammatoires, aspirine, anticoagulants
	Œdèmes des membres	Alimentation à faible teneur en sel, éviter les vêtements serrés, surveiller son poids, élever les pieds en position assise
	Troubles oculaires (conjonctivite, démangeaisons, larmoiements)	Eviter une atmosphère trop sèche ou enfumée, les longues durées devant les écrans
	Crampes et douleurs musculaires	Eviter les mouvements répétitifs et les efforts physiques importants, bien s'hydrater (1,5L d'eau/jour)
	Difficultés à respirer, toux	Surveiller l'apparition de symptômes

Pour plus de renseignements, consulter la notice du médicament.