

Interactions médicamenteuses

Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin et à votre pharmacien.

-> Interactions médicamenteuses :



- Gaviscon, Carbolevure, Smecta : intervalle de 2 heures avec Vitrakvi
- Antifongiques azolés, rifampicine, phénytoïne, carbamazépine
- Valsartan, statines, ...

-> Interactions avec les plantes (tisanes, gélules, huiles essentielles, ...) :



A éviter : pamplemousse, millepertuis, échinacée, camomille, gingembre, ginseng, thym, valériane, verveine, curcuma, aloe vera (liste non exhaustive)



Ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.

Contacts



Oncotel : 03.81.47.99.99

Nom du pharmacien (hôpital):

Disponible uniquement
en
pharmacie hospitalière



Fiche patient

VITRAKVI®

Larotrectinib

C'est un médicament indiqué dans le traitement des patients adultes et pédiatriques atteints d'une tumeur solide présentant une fusion du gène NTRK.

Présentation en solution buvable :
flacon de 100mL

Il existe 1 dosage :
20mg/mL

Ou en flacon de 56 gélules :
Il existe 2 dosages :
25/100mg



Cette fiche ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire

Cette fiche a été validée par l'équipe médicale d'oncologie

Posologie / Plan de prise

En **2 prises par jour avec un intervalle de 12h entre chaque prise**, tous les jours à la même heure, avec un grand verre d'eau, **pendant ou en dehors des repas**



Gélule : à avaler avec un grand verre d'eau

Solution buvable : Administration à l'aide d'une **seringue pour voie orale** d'un volume de 1 mL ou de 5 mL

Gélule : Conservation dans sa **boîte d'origine**, à température ambiante, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

Solution buvable : Conservation dans sa **boîte d'origine**, au réfrigérateur (**entre 2°C et 8°C**), à l'abri de l'humidité et de la chaleur. Le flacon se conserve **30 jours après ouverture**.

A conserver hors de la portée des enfants.

Contactez rapidement ONCOTEL si

- Nausées et vomissements persistants
- Constipation ou présence de douleurs abdominales et/ou d'inefficacité des mesures laxatives
- Température auriculaire > 38.3°C ou < 36°C, ou égale à 38°C deux fois à une heure d'intervalle
- Fatigue trop importante

Conseils



Se laver soigneusement les mains **avant et après** chaque prise

Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement



Utiliser une méthode de contraception efficace en cas de rapports sexuels avec une femme enceinte ou susceptible de l'être



Rapportez à l'officine les médicaments et emballages non utilisés



N'arrêtez jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin spécialiste



En cas de **soiure** des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge **rapidement et séparément**, en machine à **température élevée** (60-90°C)



Ne mangez pas de pampleousse et ne buvez pas de jus de pampleousse pendant que vous prenez VITRAKVI



Si vous avez oublié une prise de médicament :

- **ne prenez pas la dose oubliée**
- **prenez la dose habituelle le jour suivant**
- noter l'oubli

Prévention et gestion des principaux effets indésirables

	Nausées et vomissements	En cas de vomissements : Fractionner l'alimentation en plusieurs petits repas. Préférer les plats froids sans odeur aux préparations trop grasses et épicées Ne pas reprendre la prise si vomissements
	Constipation	En cas de constipation : Penser à vous hydrater. Boire au minimum 1.5 l/jour : jus de fruits, eau d'Hépar... Consommer des légumes et des fruits
	Altération du goût	Surveiller l'apparition du symptôme et prévenir votre médecin si gêne quotidienne
	Vertige, troubles de la marche	Surveiller l'apparition du symptôme et prévenir votre médecin si gêne quotidienne
	Leucopénie : baisse des globules blancs, Neutropénie : baisse des neutrophiles, risque d'infections	Surveiller les signes d'infections (fièvre, toux, brûlures urinaires) Limiter les contacts avec les personnes malades, lavage des mains, désinfection des plaies, hygiène buccale Recommander la vaccination antigrippale et antipneumococcique
	Anémie : baisse des globules rouges	Equilibre alimentaire
	Douleurs musculaires	Eviter les mouvements répétitifs et les efforts physiques importants, bien s'hydrater (1,5L d'eau/jour)
	Fatigue	Adapter son mode de vie tout en restant actif, se fixer des priorités et des moments de repos
	Perturbation du bilan hépatique	Surveillance biologique et montrer le résultat à votre médecin