

Interactions médicamenteuses

Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin et à votre pharmacien.



-> Interactions médicamenteuses :

- Gaviscon, Carbolevure, Smecta : intervalle de 2 heures avec Lomustine
- Anticoagulants oraux, ...



-> Interactions avec les plantes (tisanes, gélules, huiles essentielles, ...) :

A éviter : pamplemousse, curcuma, aloe vera, ginseng, thé vert, hibiscus (liste non exhaustive)



Ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.

Contacts



Oncotel : 03.81.47.99.99

Nom du pharmacien (hôpital):

Disponible uniquement
en
pharmacie hospitalière



Fiche patient

**BELUSTINE® ou
CECENU®
Lomustine**

C'est une chimiothérapie indiquée dans le traitement des tumeurs cérébrales

Présentation par boîte de 20 gélules déconditionnée ensuite en pots de 5 gélules

Il existe 1 dosage :
40mg




Cette fiche ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire

Cette fiche a été validée par l'équipe médicale d'oncologie

Posologie / Plan de prise

En **1 prise par jour**, avec un grand verre d'eau, de préférence le soir au coucher, ou 3 heures après un repas

6 semaines après aura lieu la prise suivante



Conservation dans sa **boîte d'origine**, à **température ambiante**, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

A conserver hors de la portée des enfants.

Contactez rapidement ONCOTEL si

- Température auriculaire > 38.3°C ou < 36°C, ou égale à 38°C deux fois à une heure d'intervalle
- Signes hémorragiques (sang dans les selles, hématomes (bleus), saignements de nez)
- Nausées et vomissements persistants

Conseils



Ne pas ouvrir les gélules



Se laver soigneusement les mains **avant et après** chaque prise



Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement

Utiliser une méthode de contraception efficace en cas de rapports sexuels avec une femme enceinte ou susceptible de l'être



Rapportez à l'officine les médicaments et emballages non utilisés



N'arrêtez jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin spécialiste



En cas de **souillure** des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge **rapidement et séparément**, en machine à **température élevée** (60-90°C)



Si vous avez oublié de prendre vos gélules le jour prévu :

- **Prenez-les à l'heure habituelle le jour suivant**
- noter l'oubli
- Un **délai de 6 semaines** devant être respecté, la prise suivante devra être décalée d'une journée

Prévention et gestion des principaux effets indésirables



Leucopénie : baisse des globules blancs,
Neutropénie : baisse des neutrophiles, risque d'infections

Surveiller les signes d'infections (fièvre, toux, brûlures urinaires)
Limiter les contacts avec les personnes malades, lavage des mains, désinfection des plaies, hygiène buccale
Recommander la vaccination antigrippale et antipneumococcique



Thrombopénie (baisse des plaquettes)

Prudence avec anti-inflammatoires, aspirine, anticoagulants



Nausées, vomissements

En cas de vomissements :
Fractionner l'alimentation en plusieurs petits repas. Préférer les plats froids sans odeur aux préparations trop grasses et épicées
Ne pas reprendre la prise si vomissements