

Interactions médicamenteuses

Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin et à votre pharmacien.



-> Interactions médicamenteuses :

- Gaviscon, Carbolevure, Smecta : intervalle de 2 heures avec Lorviqua
- Rifampicine, carbamazépine
- Antifongiques azolés



-> Interactions avec les plantes (tisanes, gélules, huiles essentielles, ...) :

A éviter : pamplemousse, millepertuis, échinacée, camomille, gingembre, ginseng, thym, valériane, verveine, curcuma, aloe vera (liste non exhaustive)




Ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.

Contacts



Oncotel : 03.81.47.99.99

Nom du pharmacien (hôpital):

Disponible uniquement
en
pharmacie de ville 

Fiche patient

LORVIQUA®

Lorlatinib

C'est un médicament indiqué dans le traitement des patients adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) ALK + avancé dont la maladie a progressé après alectinib ou céritinib ou crizotinib et au moins un autre inhibiteur de tyrosine kinase ALK.

Présentation en boîte de 30 ou gélules

Il existe 2 dosages :
25/100mg



Cette fiche ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire

Cette fiche a été validée par l'équipe médicale d'oncologie

Posologie / Plan de prise

En **1 prise par jour**, tous les jours à la même heure, avec un grand verre d'eau, **pendant ou en dehors des repas**



Conservation dans sa **boîte d'origine**, à **température ambiante**, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

A conserver hors de la portée des enfants.

Contactez rapidement ONCOTEL si

- Douleurs à l'œil, larmoiement ou rougeurs, vision floue ou sensibilité à la lumière
- Diarrhées importantes (≥ 4 selles par jour)
- Présence de douleurs abdominales et/ou d'inefficacité de ces mesures laxatives
- Si prise de poids rapide et inattendue (signe d'oedèmes)

Conseils



Ne pas couper les comprimés, ni les écraser



Se laver soigneusement les mains **avant et après** chaque prise



Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement

Utiliser une méthode de contraception efficace en cas de rapports sexuels avec une femme enceinte ou susceptible de l'être



Rapportez à l'officine les médicaments et emballages non utilisés



N'arrêtez jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin spécialiste



En cas de **souillure** des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge **rapidement et séparément**, en machine à **température élevée** (60-90°C)



Si vous avez oublié une prise de médicament :



Il reste + de 4h avant la prochaine prise



Il reste - de 4h avant la prochaine prise

➔ Prenez la dose oubliée

➔ Ne prenez pas la dose oubliée

Prévention et gestion des principaux effets indésirables

	Hypercholestérolémie et hypertriglycéridémie	Règles hygiéno diététiques Surveillance biologique et montrer le résultat à votre médecin
	Troubles de l'humeur	Si gêne dans la vie courante, contacter votre médecin
	Troubles du système nerveux - Neuropathies périphériques - Troubles de la parole	Si gêne dans la vie courante, contacter votre médecin
	Troubles de la vision	Eviter une atmosphère trop sèche ou enfumée, les longues durées devant les écrans
	Diarrhées	En cas de diarrhées : Privilégier pâtes, riz, pommes de terre, carottes cuites, banane, gelée de coing... Hydratez vous régulièrement (bouillon de légumes, tisane, coca dégazé, eau minérale...)
	Constipation	En cas de constipation : Penser à vous hydrater. Boire au minimum 1.5 l/jour : jus de fruits, eau d'Hépar... Consommer des légumes et des fruits
	Œdèmes	Alimentation à faible teneur en sel, éviter les vêtements serrés, surveiller son poids, élever les pieds en position assise
	Douleurs articulaires	Eviter les mouvements répétitifs et les efforts physiques importants, bien s'hydrater (1,5L d'eau/jour)
	Fatigue	Adapter son mode de vie tout en restant actif, se fixer des priorités et des moments de repos