

Qu'est-ce que l'olaparib?

C'est une **thérapie ciblée** indiquée dans le traitement de maintenance, après chimiothérapie par des sels de platine des **cancers récidivants de l'ovaire**, des **trompes de Fallope** et **péritonéal primitif**.

Où puis-je me procurer mon traitement ?

Disponible en **pharmacie de ville**.

Comment le conserver?

Dans sa **boîte d'origine**, à **température ambiante**, à l'abri de l'humidité et de la chaleur

Conserver hors de la portée des enfants

Comment dois-je le prendre ?

- En **2 prises** par jour de préférence à la **même heure**
- **1h après les repas**, **ne pas manger** pendant les 2 heures suivants la prise



Si vous avez oublié une prise de médicament :

- **Ne prenez pas la dose oubliée**
- **Prenez la dose habituelle le jour suivant**
- Noter l'oubli 

Consignes générales



Ne **jamais ouvrir, écraser, ni mâcher** les gélules



Se laver soigneusement les mains **avant et après** chaque prise



Rapportez à l'officine les médicaments et emballages non utilisés



N'arrêter jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin spécialiste



Attention à l'utilisation de médicaments à base de **plantes** (millepertuis)

→ **Risque d'interactions médicamenteuses**



Ne pas consommer de pamplemousse (jus ou pulpe)

→ **Risque d'interactions médicamenteuses**



En cas de **souillure** des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge **immédiatement et séparément**, en machine à **température élevée** (60-90°C)

Brochure information Patient

LYNPARZA® Olaparib 50 mg Gélules



Mieux connaître son traitement

Contact

Oncotel : 03.81.47.99.99



Cette fiche ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire.

Cette fiche a été validée par l'équipe médicale de l'IRFC-FC

LYNPARZA[®] olaparib

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

Effets indésirables potentiels principaux

Digestif

- **Nausées, vomissements, baisse de l'appétit**
- **Diarrhées**
- **Mucites, stomatites**

Fatigue, céphalées

Hématologique

- **Leucopénie**
- **Thrombopénie**
- **Anémie**

Prévention



Faire plusieurs **repas légers** et **éviter** les aliments frits, épicés et gras



Ne pas reprendre la prise si vomissements



Eviter le café, boissons glacées, lait, fruits et légumes crus et l'alcool



En cas de **diarrhées importantes** contacter un médecin

Réhydratation

Eviter les éléments acides, épicés, irritants



Brosse à dents souple, dentifrice doux (sans Menthol, éventuellement bain de bouche préventif



Consulter un médecin si **douleurs trop importantes**



Adapter son mode de vie tout en restant actif, se fixer des priorités et des **moments de repos**



Surveiller les signes d'infections (fièvre, toux, brûlures urinaires, **limiter** les **contacts** avec les personnes malades, lavage des mains, désinfection des plaies, hygiène buccale



Si **fièvre supérieure à 38°C** contacter un médecin



Prudence avec anti-inflammatoires, aspirine, anticoagulants



Si **syndrome hémorragique** contacter un médecin



Equilibre **alimentaire**



Si **fatigue** trop importante contacter un médecin



Si vous ressentez des **effets non mentionnés**, n'hésitez pas à en parler à votre médecin.