

Interactions médicamenteuses

Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin et à votre pharmacien.



-> Interactions médicamenteuses :

- Gaviscon, Carbolevure, Smecta : intervalle de 2 heures avec Lynparza
- simvastatine, pravastatine, rosuvastatine
- Fentanyl, ...

-> Interactions avec les plantes (tisanes, gélules, huiles essentielles, ...) :



A éviter : pamplemousse, millepertuis, échinacée, camomille, gingembre, ginseng, thym, valériane, verveine, curcuma, aloe vera (liste non exhaustive)



Ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.

Contacts



Oncotel : 03.81.47.99.99

Nom du pharmacien (hôpital):

Disponible uniquement en **pharmacie de ville**



et dans certains cas en **pharmacie hospitalière**



Fiche patient

LYNPARZA®

Olaparib

C'est une **thérapie ciblée** indiquée dans le traitement de maintenance, après chimiothérapie par des sels de platine des **cancers récidivants de l'ovaire, des trompes de Fallope et péritonéal primitif.**

Présentation en boîte de 112 comprimés

Il existe 2 dosages :
100/150mg



Cette fiche ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire

Cette fiche a été validée par l'équipe médicale d'oncologie

Posologie / Plan de prise

En **2 prises par jour**, tous les jours à la **même heure** avec un grand verre d'eau **pendant ou en dehors des repas (de façon constante)**



Conservation dans sa **boîte d'origine**, à **température ambiante**, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

A conserver hors de la portée des enfants.

Contactez rapidement ONCOTEL si

- Nausées et vomissements persistants
- Perte de poids rapide et importante ($\geq 5\%$ du poids initial)
- Diarrhées importantes (≥ 4 selles par jour)
- Douleurs buccales trop importantes empêchant une alimentation normale
- Température auriculaire $> 38.3^{\circ}\text{C}$ ou $< 36^{\circ}\text{C}$, ou égale à 38°C deux fois à une heure d'intervalle
- Fatigue trop importante
- Signes hémorragiques (sang dans les selles, hématomes (bleus), saignements de nez)

Conseils



Ne pas couper, mâcher, croquer ou écraser les comprimés



Se laver soigneusement les mains **avant et après** chaque prise



Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement

Utiliser une méthode de contraception efficace en cas de rapports sexuels avec une femme enceinte ou susceptible de l'être



Rapportez à l'officine les médicaments et emballages non utilisés



N'arrêtez jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin spécialiste



En cas de **souillure** des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge **rapidement et séparément**, en machine à **température élevée** ($60-90^{\circ}\text{C}$)



Si vous avez oublié une prise de médicament :

- **ne prenez pas la dose oubliée**
- **prenez la dose habituelle le jour suivant**
- noter l'oubli

Prévention et gestion des principaux effets indésirables

	Nausées et vomissements	En cas de vomissements : Fractionner l'alimentation en plusieurs petits repas. Préférer les plats froids sans odeur aux préparations trop grasses et épicées. Ne pas reprendre la prise si vomissements
	Perte d'appétit	Fractionner les repas, discuter compléments nutritionnels à la prochaine consultation
	Diarrhées	En cas de diarrhées : Privilégier pâtes, riz, pommes de terre, carottes cuites, banane, gelée de coing... Hydratez vous régulièrement (bouillon de légumes, tisane, coca dégazé, eau minérale...)
	Mucites (inflammation de la bouche)	Adapter votre brossage de dents : Brosse souple, dentifrice doux (sans menthol), bain de bouche préventif
	Fatigue, céphalées	Adapter son mode de vie tout en restant actif, se fixer des priorités et des moments de repos
	Leucopénie : baisse des globules blancs, neutropénie : baisse des neutrophiles, risque d'infections	Surveiller les signes d'infections (fièvre, toux, brûlures urinaires) Limiter les contacts avec les personnes malades, lavage des mains, désinfection des plaies, hygiène buccale Recommander la vaccination antigrippale et antipneumococcique
	Anémie : baisse des globules rouges	Equilibre alimentaire
	Thrombopénie : baisse des plaquettes	Prudence avec anti-inflammatoires, aspirine, anticoagulants

Pour plus de renseignements, consulter la notice du médicament.