

Interactions médicamenteuses

Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin et à votre pharmacien.

-> Interactions médicamenteuses :



- Gaviscon, Carbolevure, Smecta : intervalle de 2 heures avec Tagrisso
- Rifampicine, carbamazépine
- Antifongiques azolés, ...

-> Interactions avec les plantes (tisanes, gélules, huiles essentielles, ...) :



A éviter : pamplemousse, millepertuis, échinacée, camomille, gingembre, ginseng, thym, valériane, verveine, curcuma, aloe vera (liste non exhaustive)




Ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.

Contacts



Oncotel : 03.81.47.99.99

Nom du pharmacien (hôpital):

Disponible uniquement
en
pharmacie de ville 

Fiche patient

TAGRISSO®
Osimertinib

C'est une thérapie ciblée indiquée dans le traitement du cancer bronchique non à petites cellules

Il est présenté par boîtes de 30 gélules (plaquettes de 10)

Il existe 1 dosage :
40/80 mg



Cette fiche ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire

Cette fiche a été validée par l'équipe médicale d'oncologie

Posologie / Plan de prise

En 1 prise par jour, tous les jours à la même heure, avec un grand verre d'eau, **pendant ou en dehors des repas**



En cas de difficultés pour avaler, **dispersion possible** dans un verre d'eau **non gazeuse**. **Rincer** avec un demi-verre d'eau et le **boire entièrement**

Conservation dans sa **boîte d'origine**, à **température ambiante**, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

A conserver hors de la portée des enfants.

Contactez rapidement ONCOTEL si

- Diarrhées importantes (≥4 selles par jour)
- Douleurs buccales trop importantes empêchant une alimentation normale
- Toux ou essoufflements persistants
- Palpitations
- Prise de poids rapide et inattendue (signe d'oedèmes)
- Troubles cutanés gênant au quotidien
- Douleurs à l'œil, larmoiement ou rougeurs, vision floue ou sensibilité à la lumière
- Température auriculaire > 38.3°C ou < 36°C, ou égale à 38°C deux fois à une heure d'intervalle
- Signes hémorragiques (sang dans les selles, hématomes (bleus), saignements de nez)

Conseils



Ne pas couper, mâcher, croquer ou écraser les comprimés



Se laver soigneusement les mains **avant et après** chaque prise



Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement

Utiliser une méthode de contraception efficace en cas de rapports sexuels avec une femme enceinte ou susceptible de l'être



Rapportez à l'officine les médicaments et emballages non utilisés



N'arrêtez jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin spécialiste



En cas de **soiure** des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge **rapidement et séparément**, en machine à **température élevée** (60-90°C)



Si vous avez oublié une prise de médicament :

Il reste + de **12h** avant la prochaine prise

→ Prenez la dose oubliée



Il reste - de **12h** avant la prochaine prise

→ Ne prenez pas la dose oubliée

Prévention et gestion des principaux effets indésirables

	Diarrhées	En cas de diarrhées : Privilégier pâtes, riz, pommes de terre, carottes cuites, banane, gelée de coing... Hydratez vous régulièrement (bouillon de légumes, tisane, coca dégazé, eau minérale...)
	Stomatites (inflammation de l'intérieur de la bouche)	Adapter votre brossage de dents : Brosse souple, dentifrice doux (sans menthol), bain de bouche préventif
	Toux, essoufflement	Surveiller l'apparition de symptômes
	Trouble du rythme cardiaque	surveillance cardiaque
	Œdèmes	Alimentation à faible teneur en sel, éviter les vêtements serrés, surveiller son poids, élever les pieds en position assise
	Cutané - éruption, acné, sécheresse de la peau, photosensibilité,	Eviter les frottements et l'eau trop chaude Eviter les expositions au soleil et utiliser un écran solaire total Utiliser un savon doux et une crème émoulliente Surveiller la surinfection
	Ongles (onycholyse, onychodystrophie et paronychie)	Garder les doigts et les orteils propres, les ongles coupés. Evitez les manucures agressives et porter des chaussures confortables
	Troubles oculaires (conjonctivite, démangeaisons, larmoiements)	Eviter une atmosphère trop sèche ou enfumée, les longues durées devant les écrans
	Leucopénie : baisse des globules blancs, Neutropénie : baisse des neutrophiles, risque d'infections	Surveiller les signes d'infections (fièvre, toux, brûlures urinaires) Limiter les contacts avec les personnes malades, lavage des mains, désinfection des plaies, hygiène buccale Recommander la vaccination antigrippale et antipneumococcique
	Thrombopénie : baisse des plaquettes	Prudence avec anti-inflammatoires, aspirine, anticoagulants

Pour plus de renseignements, consulter la notice du médicament.