

## Qu'est-ce que palbociclib ?

C'est une thérapie ciblée indiquée dans le traitement du cancer du sein en association au fulvestrant

## Où puis-je me procurer mon traitement ?

Disponible en **pharmacie de ville**

## Comment le conserver ?

Dans sa **boîte d'origine**, à **température ambiante**, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

**Conserver hors de la portée des enfants**

## Comment dois-je le prendre ?

**En 1 prise par jour**, tous les jours à la **même heure** avec un grand verre d'eau **pendant un repas**

**En alternance : 21 jours de traitement** puis **7 jours de pause**



Aucune gélule ne doit être avalée si elle est **brisée ou fissurée**

## Consignes générales



Ne **jamais ouvrir, écraser, ni mâcher** les gélules



Se laver soigneusement les mains **avant et après** chaque prise



Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement

Utiliser une méthode de contraception efficace en cas de rapports sexuels avec une femme enceinte ou susceptible de l'être



Rapportez à l'officine les médicaments et emballages non utilisés



**N'arrêtez jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin spécialiste**



**Eviter** l'utilisation de médicaments à base de **plantes** (millepertuis) et éviter la consommation de **pampleousse** (jus ou pulpe) qui peuvent interagir avec les médicaments



En cas de **souillure** des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge **rapidement et séparément**, en machine à **température élevée (60-90°C)**



Si vous avez oublié une prise de médicament :

- **Ne prenez pas la dose oubliée**
- **Prenez la dose habituelle le jour suivant**
- Noter l'oubli

## Brochure information Patient

# IBRANCE® Palbociclib 75-100-125 mg Gélules



## Mieux connaître son traitement

### Contact

**Oncotel : 03.81.47.99.99**



*Cette fiche ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire.*

Cette fiche a été validée par l'équipe médicale de l'IRFC-FC

# PALBOCICLIB® palbociclib

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

## Effets indésirables potentiels principaux

### Digestif

- Nausées/vomissements, perte d'appétit
- Diarrhées
- Mucite

### Hématologique

- Leucopénie
- Anémie
- Thrombopénie

### Eruption cutanée (prurit, dermatite)

### Alopécie

### Fatigue

## Prévention



Faire plusieurs repas légers et éviter les aliments frits, épicés et gras



Eviter le café, boissons glacées, lait, fruits et légumes crus et l'alcool  
Réhydratation



Brosse à dent souple, dentifrice doux (sans menthol), éventuellement bains de bouche préventifs



Limiter les contacts avec les personnes malades, lavage des mains, désinfection des plaies, hygiène buccale



Equilibre alimentaire



Prudence avec les anti-inflammatoires, aspirine, anticoagulants



Eviter les vêtements serrés, les frottements le soleil, l'eau chaude. Utiliser un savon doux et une crème émolliente



Cheveux clairsemés. Se laver les cheveux à distance de la prise des capsules.



Adapter son mode de vie tout en restant actif, se fixer des priorités et des moments de repos



Ne pas reprendre la prise si vomissements



En cas de diarrhées importantes contacter un médecin



Si douleurs trop importantes contacter un médecin



Si fièvre supérieure ou égale à 38°C contacter un médecin



Si fatigue trop importante, contacter un médecin



Si syndrome hémorragique, contacter un médecin



En cas de gêne au quotidien contacter un médecin



Si vous ressentez des **effets non mentionnés**, n'hésitez pas à en parler à votre médecin.