

Interactions médicamenteuses

Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin et à votre pharmacien.



-> Interactions médicamenteuses :

- Gaviscon, Carbolevure, Smecta : intervalle de 2 heures avec Stivarga
- Anticoagulants oraux
- Statines,

-> Interactions avec les plantes (tisanes, gélules, huiles essentielles, ...) :



A éviter : pamplemousse, millepertuis, échinacée, camomille, gingembre, ginseng, thym, valériane, verveine, curcuma, aloe vera, hibiscus, menthe poivrée (liste non exhaustive)



Ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.

Contacts



Oncotel : 03.81.47.99.99

Nom du pharmacien (hôpital):

Disponible uniquement
en
pharmacie de ville 

Fiche patient

STIVARGA®

Regorafenib

C'est une thérapie ciblée indiquée dans le traitement :
du cancer colorectal
de tumeurs stromales gastro-intestinales

Présentation en boîte de 84 comprimés (flacons de 28)

Il existe 1 dosage :
40mg



Cette fiche ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire

Cette fiche a été validée par l'équipe médicale d'oncologie

Posologie / Plan de prise

En 1 prise par jour, tous les jours à la **même heure** avec un grand verre d'eau, le matin **après un repas pauvre en graisses**

En continu pendant 21 jours suivi d'une **pause de 7 jours**



Conservation dans sa **boîte d'origine**, à **température ambiante**, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

A conserver hors de la portée des enfants.

Contactez rapidement ONCOTEL si

- Perte de poids rapide et importante ($\geq 5\%$ du poids initial)
- Diarrhées importantes (≥ 4 selles par jour)
- Symptômes d'hypertension (Maux de tête, bourdonnements d'oreille et/ou vertiges)
- Syndrome main-pied gênant au quotidien

Conseils



Ne pas couper, mâcher, croquer ou écraser les comprimés



Se laver soigneusement les mains **avant et après** chaque prise



Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement

Utiliser une méthode de contraception efficace en cas de rapports sexuels avec une femme enceinte ou susceptible de l'être



Rapportez à l'officine les médicaments et emballages non utilisés



N'arrêtez jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin spécialiste



En cas de **souillure** des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge **rapidement et séparément**, en machine à **température élevée** (60-90°C)



Si vous avez oublié une prise de médicament :

la **dose** doit être **prise** le même jour, **dès que vous vous apercevez de l'oubli**

Prévention et gestion des principaux effets indésirables



Perte d'appétit

Fractionner les repas, discuter compléments nutritionnels à la prochaine consultation



Diarrhées

En cas de diarrhées : Privilégier pâtes, riz, pommes de terre, carottes cuites, banane, gelée de coing... Hydratez vous régulièrement (bouillon de légumes, tisane, coca dégazé, eau minérale...)



Hypertension artérielle

Mesurer régulièrement la tension, savoir reconnaître les signes d'hypertension : maux de tête, troubles de la vision, bourdonnements d'oreilles
 Limiter la consommation de sel



Syndrome main-pied

Eviter les chaussures serrées, les frottements
 Utiliser un savon doux et une crème hydratante
 Surveiller la surinfection



Dysphonie

Eviter le tabac, les poussières, le froid, boire régulièrement pour hydrater les cordes vocales, repos vocal



Fatigue

Adapter son mode de vie tout en restant actif, se fixer des priorités et des moments de repos