

Interactions médicamenteuses

Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin et à votre pharmacien.



-> Interactions médicamenteuses :

- Gaviscon, Carbolevure, Smecta : intervalle de 2 heures avec Kisqali
- Anticoagulants oraux
- Amiodarone, simvastatine, ...



-> Interactions avec les plantes (tisanes, gélules, huiles essentielles, ...) :

A éviter : pamplemousse, millepertuis, échinacée, camomille, gingembre, ginseng, thym, valériane, verveine, curcuma, aloe vera, chardon-marie (liste non exhaustive)




Ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.

Contacts



Oncotel : 03.81.47.99.99

Nom du pharmacien (hôpital):

Disponible uniquement
en
pharmacie de ville 

Fiche patient

KISQALI®

Ribociclib

C'est une thérapie ciblée indiquée dans le traitement du cancer du sein en association au fulvestrant ou un inhibiteur de l'aromatase

Présentation en boîte de 21, 42 ou 63 comprimés (plaquettes de 14 ou 21)

Il existe 1 dosage :
200mg




Cette fiche ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire

Cette fiche a été validée par l'équipe médicale d'oncologie

Posologie / Plan de prise

En 1 prise par jour, tous les jours à la **même heure**, avec un grand verre d'eau, **pendant ou en dehors des repas**

En alternance : 21 jours de traitement puis 7 jours de pause



Conservation dans sa **boîte d'origine**, à **température ambiante**, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

A conserver hors de la portée des enfants.

Contactez rapidement ONCOTEL si

- Nausées et vomissements persistants
- Perte de poids rapide et importante ($\geq 5\%$ du poids initial)
- Diarrhées importantes (≥ 4 selles par jour)
- Douleurs buccales trop importantes empêchant une alimentation normale
- Température auriculaire $> 38.3^\circ\text{C}$ ou $< 36^\circ\text{C}$, ou égale à 38°C deux fois à une heure d'intervalle
- Fatigue trop importante
- Signes hémorragiques (sang dans les selles, hématomes (bleus), saignements de nez)
- Toux ou essoufflements persistants

Conseils



Ne pas **ouvrir, écraser, ni mâcher** les comprimés



Se laver soigneusement les mains **avant et après** chaque prise



Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement

Utiliser une méthode de contraception efficace en cas de rapports sexuels avec une femme enceinte ou susceptible de l'être



Rapportez à l'officine les médicaments et emballages non utilisés



N'arrêtez jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin spécialiste
















En cas de **souillure** des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge **rapidement et séparément**, en machine à **température élevée** ($60-90^\circ\text{C}$)



Si vous avez oublié une prise de médicament :

- **ne prenez pas la dose oubliée**
- **prenez la dose habituelle le jour suivant**
- noter l'oubli

Prévention et gestion des principaux effets indésirables

	Nausées et vomissements	En cas de vomissements : Fractionner l'alimentation en plusieurs petits repas. Préférer les plats froids sans odeur aux préparations trop grasses et épicées. Ne pas reprendre la prise si vomissements
	Perte d'appétit	Fractionner les repas, discuter compléments nutritionnels à la prochaine consultation
	Diarrhées	En cas de diarrhées : Privilégier pâtes, riz, pommes de terre, carottes cuites, banane, gelée de coing... Hydratez vous régulièrement (bouillon de légumes, tisane, coca dégazé, eau minérale...)
	Gingivites (inflammation des gencives), Stomatites (inflammation de l'intérieur de la bouche)	Adapter votre brossage de dents : Brosse souple, dentifrice doux (sans menthol), bain de bouche préventif
	Leucopénie : baisse des globules blancs, Neutropénie : baisse des neutrophiles, risque d'infections	Surveiller les signes d'infections (fièvre, toux, brûlures urinaires) Limiter les contacts avec les personnes malades, lavage des mains, désinfection des plaies, hygiène buccale Recommander la vaccination antigrippale et antipneumococcique
	Anémie : baisse des globules rouges	Equilibre alimentaire
	Thrombopénie (diminution des plaquettes)	Prudence avec anti-inflammatoires, aspirine, anticoagulants
	Eruption cutanée (prurit, dermatite)	Eviter les frottements et l'eau trop chaude Eviter les expositions au soleil et utiliser un écran solaire total Utiliser un savon doux et une crème hydratante. Surveiller la surinfection
	Dyspnée, toux	Surveiller l'apparition de symptômes
	Perte de cheveux / cheveux fragilisés	Se laver les cheveux à distance de la prise des médicaments,
	Fatigue	Adapter son mode de vie tout en restant actif, se fixer des priorités et des moments de repos
	Céphalées	Bien s'hydrater : 1,5 L d'eau par jour
	Anomalie du bilan biologique	Surveillance biologique et montrer le résultat à votre médecin