

Interactions médicamenteuses

Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin et à votre pharmacien.

-> Interactions médicamenteuses :



- Gaviscon, Carbolevure, Smecta : intervalle de 2 heures avec Loxo 292
- Antifongiques azolés, rifampicine, phénytoïne, carbamazépine
- Inhibiteurs de pompe à protons, ...

-> Interactions avec les plantes (tisanes, gélules, huiles essentielles, ...) :



A éviter : pamplemousse, millepertuis, échinacée, camomille, gingembre, ginseng, thym, valériane, verveine, curcuma, aloe vera (liste non exhaustive)



Ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.

Contacts



Oncotel : 03.81.47.99.99

Nom du pharmacien (hôpital):

Disponible uniquement
en
pharmacie hospitalière



Fiche patient

LOXO 292[®]

Selpercatinib

C'est une thérapie ciblée indiquée dans le traitement des patients adultes et pédiatriques atteints d'une tumeur solide présentant une mutation RET.

Présentation en solution buvable :
flacon de 300mL
Il existe 1 dosage :
20 mg/mL

ou en flacon de 60/120 gélules :
Il existe 2 dosages :
40/80 mg



Cette fiche ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire

Cette fiche a été validée par l'équipe médicale d'oncologie

Posologie / Plan de prise

En **2 prises par jour avec un intervalle de 12h entre chaque prise**, tous les jours à la même heure, avec un grand verre d'eau, **pendant ou en dehors des repas (de façon constante)**



Gélule : à avaler avec un grand verre d'eau

Solution buvable : Administration à l'aide d'une **seringue pour voie orale**

Gélule : Conservation dans sa **boîte d'origine**, à température ambiante, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

Solution buvable : Conservation dans sa **boîte d'origine**, au réfrigérateur (**entre 2°C et 8°C**), à l'abri de l'humidité et de la chaleur. Le flacon se conserve **42 jours après ouverture**.

A conserver hors de la portée des enfants.

Contactez rapidement ONCOTEL si

- Nausées et vomissements persistants
- Constipation ou présence de douleurs abdominales et/ou d'inefficacité des mesures laxatives
- Diarrhées importantes (≥4 selles par jour)
- En cas de maux de tête importants et inhabituels
- Symptômes d'hypertension (Maux de tête, bourdonnements d'oreille et/ou vertiges)
- Si prise de poids rapide et inattendue (signe d'oedèmes)

Conseils



Se laver soigneusement les mains **avant et après** chaque prise



Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement

Utiliser une méthode de contraception efficace en cas de rapports sexuels avec une femme enceinte ou susceptible de l'être



Rapportez à l'officine les médicaments et emballages non utilisés



N'arrêtez jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin spécialiste



En cas de **souillure** des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge **rapidement et séparément**, en machine à **température élevée** (60-90°C)



Si vous avez oublié une prise de médicament :

Il reste **+ de 6h** avant la prochaine prise

→ Prenez la dose oubliée



Il reste **- de 6h** avant la prochaine prise

→ Ne prenez pas la dose oubliée

Prévention et gestion des principaux effets indésirables

	Nausées et vomissements	En cas de vomissements : Fractionner l'alimentation en plusieurs petits repas. Préférer les plats froids sans odeur aux préparations trop grasses et épicées Ne pas reprendre la prise si vomissements
	Constipation	En cas de constipation : Penser à vous hydrater. Boire au minimum 1.5 l/jour : jus de fruits, eau d'Hépar... Consommer des légumes et des fruits
	Diarrhées	En cas de diarrhées : Privilégier pâtes, riz, pommes de terre, carottes cuites, banane, gelée de coing... Hydratez vous régulièrement (bouillon de légumes, tisane, coca dégazé, eau minérale...)
	Sècheresse de la bouche	Surveiller l'apparition du symptôme et prévenir votre médecin si gêne quotidienne
	Maux de tête	Se reposer, prise de Paracétamol possible
	Hypertension	Mesurer régulièrement la tension, savoir reconnaître les signes d'hypertension : maux de tête, troubles de la vision, bourdonnements d'oreilles Limiter la consommation de sel
	Œdèmes	Alimentation à faible teneur en sel, éviter les vêtements serrés, surveiller son poids, élever les pieds en position assise
	Fatigue	Adapter son mode de vie tout en restant actif, se fixer des priorités et des moments de repos
	Perturbation du bilan biologique	Surveillance biologique et montrer le résultat à votre médecin