

Interactions médicamenteuses

Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin et à votre pharmacien.

-> Interactions médicamenteuses :



- Gaviscon, Carbolevure, Smecta : intervalle de 2 heures avec Odomzo
- Statines
- Antifongiques azolés, ...

-> Interactions avec les plantes (tisanes, gélules, huiles essentielles, ...) :



A éviter : pamplemousse, millepertuis, échinacée, camomille, gingembre, ginseng, thym, valériane, verveine, curcuma, aloe vera (liste non exhaustive)




Ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.

Contacts



Oncotel : 03.81.47.99.99

Nom du pharmacien (hôpital):

Disponible uniquement
en
pharmacie de ville 

Fiche patient

ODOMZO®

Sonidegib

C'est une thérapie ciblée indiquée dans le traitement des patients adultes présentant un carcinome basocellulaire localement avancé qui ne relève pas d'une chirurgie curative ou d'une radiothérapie

Présentation en boîte de 30 gélules (plaquettes de 10)

Il existe 1 dosage :
200mg



Cette fiche ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire

Cette fiche a été validée par l'équipe médicale d'oncologie

Posologie / Plan de prise

En 1 prise par jour, tous les jours à la **même heure** avec un grand verre d'eau, **au moins 1h avant ou 2h après un repas**



Conservation dans sa **boîte d'origine**, à **température ambiante**, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

A conserver hors de la portée des enfants.

Contactez rapidement ONCOTEL si

- Nausées et vomissements persistants
- Diarrhées importantes (≥4 selles par jour)
- Perte de poids rapide et importante (≥5% du poids initial)
- Troubles cutanés gênant au quotidien
- Douleurs à la tête importantes et inhabituelles

Conseils



Ne pas ouvrir les gélules



Se laver soigneusement les mains **avant et après** chaque prise

Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement



Utiliser une méthode de contraception efficace en cas de rapports sexuels avec une femme enceinte ou susceptible de l'être



Rapportez à l'officine les médicaments et emballages non utilisés



N'arrêtez jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin spécialiste



En cas de **souillure** des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge **rapidement et séparément**, en machine à **température élevée** (60-90°C)



Si vous avez oublié une prise de médicament :



Il reste + de 6h avant la prochaine prise



Il reste - de 6h avant la prochaine prise

→ Prenez la dose oubliée

→ Ne prenez pas la dose oubliée

Prévention et gestion des principaux effets indésirables

	Troubles musculaires Augmentation des CPK	Surveillance biologique et montrer le résultat à votre médecin
	Douleurs musculaires	Eviter les mouvements répétitifs et les efforts physiques importants, bien s'hydrater (1,5L d'eau/jour)
	Nausées et vomissements	En cas de vomissements : Fractionner l'alimentation en plusieurs petits repas. Préférer les plats froids sans odeur aux préparations trop grasses et épicées. Ne pas reprendre la prise si vomissements
	Diarrhées	En cas de diarrhées : Privilégier pâtes, riz, pommes de terre, carottes cuites, banane, gelée de coing... Hydratez vous régulièrement (bouillon de légumes, tisane, coca dégazé, eau minérale...)
	Perte d'appétit	Fractionner les repas, discuter compléments nutritionnels à la prochaine consultation
 	Cutanés - éruption, acné, sécheresse de la peau, photosensibilité,	Eviter les chaussures serrées, les frottements et l'eau trop chaude. Eviter les expositions au soleil et utiliser un écran solaire total. Utiliser un savon doux et une crème hydratante. Surveiller la surinfection
	Perte de cheveux / cheveux fragilisés	Se laver les cheveux à distance de la prise des médicaments, se couper les cheveux courts. Envisager une prothèse capillaire
	Maux de tête	Se reposer, prise de Paracétamol possible
	Fatigue	Adapter son mode de vie tout en restant actif, se fixer des priorités et des moments de repos

Pour plus de renseignements, consulter la notice du médicament.