

## Qu'est-ce LONSURF ?

Médicament indiqué dans le traitement du cancer colorectal métastatique

## Où puis-je me procurer mon traitement ?

Disponible en **pharmacie de ville**


## Comment le conserver ?

Dans sa **boîte d'origine**, à **température ambiante**, à l'abri de l'humidité et de la chaleur

**Conserver hors de la portée des enfants**


## Comment dois-je le prendre ?

2 administrations par jour, aux **Jours 1 à 5** puis aux **Jours 8 à 12** de chaque cycle de traitement (1 cycle de traitement = 28 jours)



Avec un **verre d'eau** dans l'heure qui suit la **fin des repas du matin et du soir**

Si vous avez oublié une prise de médicament :

- ne prenez pas la dose oubliée
- prenez la dose habituelle le jour suivant
- noter l'oubli 

## Consignes générales



Ne coupez pas les comprimés, ne les écrasez pas



Lavez-vous soigneusement les mains **avant et après** chaque prise



N'utilisez pas ce traitement pendant la grossesse ou l'allaitement  
Utilisez une méthode de contraception efficace en cas de rapports sexuels pendant la durée du traitement



Rapportez à l'officine les médicaments et emballages non utilisés



**N'arrêtez jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin spécialiste**



Evitez l'utilisation de médicaments à base de **plantes** (millepertuis) et éviter la consommation de **pamplemousse** (jus ou pulpe) qui peuvent interagir avec les médicaments



En cas de **souillure** des draps ou des vêtements (vomissements...), lavez ce linge **rapidement et séparément**, en machine à **température élevée** (60-90°C)

## Brochure information Patient

# LONSURF<sup>®</sup>

## Trifluridine-Tipiracil chlorhydrate

### 15mg/6,14mg et 20mg/8,19mg

## Comprimés



## Mieux connaître son traitement

### Contact

**Oncotel : 03.81.47. 99.99**



*Cette fiche ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire.*

Cette fiche a été validée par l'équipe médicale de l'IRFC-FC

# LONSURF<sup>®</sup> trifluridine-Tipiracil chlorhydrate

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

## Effets indésirables potentiels principaux

### Digestif

- Nausées, vomissements,
- Diarrhées
- Stomatite
- Perte d'appétit

### Hématologique

- Leucopénie = baisse des globules blancs
- Anémie = baisse des globules rouges
- Thrombopénie = baisse des plaquettes

### Fatigue

## Prévention



Faire plusieurs repas légers et éviter les aliments frits, épicés et gras



Ne pas reprendre la prise si vomissements



Eviter le café, boissons glacées, lait, fruits et légumes crus et l'alcool  
Réhydratation



En cas de diarrhées importantes contacter un médecin



Brosse à dent souple, dentifrice doux (sans menthol), éventuellement bain de bouche préventifs



Si douleurs trop importantes contacter un médecin



Fractionner les repas, discuter compléments alimentaires à la prochaine consultation

Surveillance biologique et montrer le résultat à votre médecin



Limiter les contacts avec les personnes malades  
Surveiller les signes d'infections (fièvre, toux, brulures urinaires)  
Lavage des mains, désinfection des plaies, hygiène buccale



Si fièvre supérieure à 38°C, contacter un médecin



Equilibre alimentaire



Si fatigue trop importante, contacter un médecin



Prudence avec anti-inflammatoires, aspirine, anticoagulants



Si saignements, contacter un médecin



Adapter son mode de vie tout en restant actif, se fixer des priorités et des moments de repos



Si vous ressentez des **effets non mentionnés**, n'hésitez pas à en parler à votre médecin.