

Interactions médicamenteuses

Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin et à votre pharmacien.

-> Interactions médicamenteuses :



- Gaviscon, Carbolevure, Smecta : intervalle de 2 heures avec Caprelsa
- Anticoagulants oraux
- Médicaments allongeant le QT
- Antifongiques azolés, ...

-> Interactions avec les plantes (tisanes, gélules, huiles essentielles, ...) :



A éviter : millepertuis, pamplemousse, curcuma, ginkgo, ginseng, sauge (liste non exhaustive)




Ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.

Contacts



Oncotel : 03.81.47.99.99

Nom du pharmacien (hôpital):

Disponible uniquement
en
pharmacie de ville 

Fiche patient

CAPRELSA®

Vandétanib

C'est une thérapie ciblée indiquée dans le traitement du cancer de la thyroïde

Présentation par boîtes de 30 comprimés (plaquettes de 10)

Il existe 2 dosages :
100/ 300mg



Cette fiche ne remplace pas les recommandations de votre médecin, mais vise à vous apporter une information complémentaire

Cette fiche a été validée par l'équipe médicale d'oncologie

Posologie / Plan de prise

En **1 prise par jour**, tous les jours à la **même heure** avec un grand verre d'eau pendant ou en dehors des repas.

Vous pouvez dissoudre le comprimé **UNIQUEMENT** dans de l'eau **non gazeuse**, sans l'écraser et attendre la **dissolution complète (10 min)**. Rincer ensuite avec un **demi-verre d'eau que vous boirez**



Conservation dans sa **boîte d'origine**, à **température ambiante**, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

A conserver hors de la portée des enfants.

Contactez rapidement ONCOTEL si

- Nausées et vomissements persistants
- Diarrhées importantes (≥4 selles par jour)
- Signes d'hypertension (Maux de tête, bourdonnements d'oreille et/ou vertiges)
- Toux ou essoufflements persistants
- Douleurs à l'œil, larmoiement ou rougeurs, vision floue ou sensibilité à la lumière

Conseils



Ne pas couper, mâcher, croquer ou écraser les comprimés



Se laver soigneusement les mains **avant et après** chaque prise



Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement

Utiliser une méthode de contraception efficace en cas de rapports sexuels avec une femme enceinte ou susceptible de l'être



Rapportez à l'officine les médicaments et emballages non utilisés



N'arrêtez jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin spécialiste



En cas de **souillure** des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge **rapidement et séparément**, en machine à **température élevée** (60-90°C)



Si vous avez oublié une prise de médicament :



Il reste + de 12h avant la prochaine prise



Il reste - de 12h avant la prochaine prise



Prenez la dose oubliée



Ne prenez pas la dose oubliée

Prévention et gestion des principaux effets indésirables

	Nausées et vomissements	En cas de vomissements : Fractionner l'alimentation en plusieurs petits repas. Préférer les plats froids sans odeur aux préparations trop grasses et épicées Ne pas reprendre la prise si vomissements
	Diarrhées	En cas de diarrhées : Privilégier pâtes, riz, pommes de terre, carottes cuites, banane, gelée de coing... Hydratez vous régulièrement (bouillon de légumes, tisane, coca dégazé, eau minérale...)
	Hypertension artérielle	Mesurer régulièrement la tension, savoir reconnaître les signes d'hypertension : maux de tête, troubles de la vision, bourdonnements d'oreilles
	Cutané - éruption, acné, sècheresse de la peau, photosensibilité, Syndrome main pied	Eviter les chaussures serrées, les frottements et l'eau trop chaude Eviter les expositions au soleil et utiliser un écran solaire total Utiliser un savon doux et une crème hydratante. Surveiller la surinfection
	Toux, essoufflement	Surveiller l'apparition de symptômes
	Fatigue	Adapter son mode de vie tout en restant actif, se fixer des priorités et des moments de repos
	Troubles oculaires	Eviter une atmosphère trop sèche ou enfumée, les longues durées devant les écrans

Pour plus de renseignements, consulter la notice du médicament.